

# SEMANARIO ECONOMICO

QUE PUBLICA LA REAL SOCIEDAD MALLORQUINA.

PALMA 1.º DE AGOSTO DE 1818.

*Hoy sale el sol en nuestro horizonte á las 5 h. y 0 minutos  
y se pone á las 7 h. y 0 minutos.*

*Precios corrientes de varios artículos de consumo ordinario.*

		Inferior.			Superior.		
		lib.	s.	d.	lib.	s.	d.
ACEYTE.....	Mercader cuartan.	0	0	0	0	0	0
	Tendero ... idem.	2	3	0	2	7	6
	Jabonero ... idem.	1	19	6	2	5	6
GRANOS. <i>Precios de la Cuartera.</i>	Candeal barquilla...	1	0	0	1	4	0
	Trigo gordo idem.	0	18	6	0	19	0
	Trigo forastero id.	0	18	0	1	0	0
	Trigo menudo id.	0	0	0	0	0	0
	Cebada ..... idem.	0	8	6	0	9	0
	Avena ..... idem.	0	5	8	0	6	0
LEGUMBRES. <i>Precios del últi- mo mercado.</i>	Habas ..... almud..	0	3	0	0	3	4
	Guijas ..... idem...	0	2	8	0	0	0
	Garbanzos idem...	0	4	0	0	0	0
Almendra cuartera.....	0	0	0	0	0	0	
Almendron quintal. ....	22	15	0	23	5	0	
Carbon de Encina arroba.....	0	3	0	0	3	4	
Idem de Mata.....	0	2	4	0	2	8	
Algarrobas quintal.....	2	6	0	2	7	0	
Queso..... idem.....	8	0	0	13	0	0	
Lana..... idem.....	12	0	0	14	10	0	
Cáñamo.... idem.....	16	10	0	18	0	0	
Paja..... idem.....	0	7	0	0	9	0	

Por el último precio de las ludas resulta que el pan comun de ocho dineros debe pesar hoy 9 onzas y media.

Los tres panecillos candeales, que componen 15 onzas mallorquinas valen hoy 23 dineros.

*Enbarcaciones que han dado fondo en este Puerto de Palma.*

*Dia 26 de Julio.*

P. Juan Mateu mall. laud Virgen del Rosario, venido de Gandía con melones.

Cap. Jorge Sain ruso bergantin Miltiades, venido de Idra con trigo.

P. Damian Canals mall. javeque Concepcion, venido de Cullera con un pasag. y arroz.

P. Jayme Vidal mall. javega Santo Cristo, venido de Cullera con un pasag., arroz y ropas.

P. Jayme Duart catalan javeque San Francisco, venido de Tortosa con madera.

*Dia 27.*

Cap. José Lambi napolitano polacra Ecce-Homo, venido de Palermo con algarrobas.

P. Rafael Llull mall. laud Ecce-Homo, venido de Mahon con trigo.

P. Antonio Nadal mall. javeque San Antonio, venido de Valencia con 18 pasag., lastre y balija salió dia 22.

P. Tomas Sastre mall. javeque San Fernando, venido de Mahon con 13 pasag., trigo y balija salió dia 25.

*Dia 28.*

P. Juan Carlos Costa mahones javega Esperanza, venido de Mahon con trigo.

*Dia 29.*

P. Jayme Pujol catalan canario San Antonio, venido de Areñis con terralla y madera.

P. Ventura Pieras mall. laud Virgen del buen Camino, venido de Iviza con un pasag. y lastre.

*Dia 30.*

P. Jayme Gelebert mall. laud Santísima Trinidad, venido de Aguasmuertas con palos de mano.

Cap. Antonio Rubin frances bonbarda Santa Rosalia, venido de Marsella con trigo para Valencia.

Cap. Geovany Nicola ruso bergantin Minerva, venido de Idra con trigo.

La mayor parte de nuestros jardineros dedicados al ramo de floristas, creen que los lirios, tulipanes, anémones, francesillas &c. no producen semilla, ó que si la producen no es apropósito para propagar la especie; por otra parte, como generalmente conservan solo las plantas de flor doble y destruyen las sencillas y semidobles, no pueden obtener aquel producto, pues es claro que las flores llenas no dan semilla, porque carecen de los órganos sexuales, convertidos en pétalos por el cultivo; y esta es la causa porque por una parte ignorando los buenos principios, y por otra conservando solo aquellas plantas, cuyas flores dobles, llenas, prolíferas, multiplicadas ó monstruosas no dan semilla, se mantienen en el error primitivo, sin dar un paso que adelante ó mejore su sistema de cultivo.

Así pues el que quiera obtener especies y variedades nuevas, no le queda otro arbitrio que usar de las semillas para la propagación de las plantas. Esta regla, que es general para todos los ramos del cultivo, es de mayor importancia en la jardinería, y principalmente para el ramo del florista en que todo es capricho, lujo y galantería. Sabemos ya por el estudio de la fisiología vegetal, y por lo que muchas veces hemos repetido en estas lecciones, que las plantas de un mismo género, y mucho mas aun las de una misma especie, son muy propensas á la hibricidad; esto es, á que fecundándose los ovarios de unas plantas con el polen de las anteras de otra diferente, produzcan individuos mestizos, que ni bien se parecen al padre, ni bien á la madre, y entonces suelen resultar especies nuevas, ó quando ménos variedades muy raras, y por lo mismo muy apreciadas de los apasionados de Flora. Al jardinero, cuya práctica esté fundada sobre los conocimientos de la fisiología vegetal y sobre los demas que hasta aquí llevamos esplicados, le será muy fácil hacer por su gusto fecundaciones híbridas, tomando las flores de una planta y aplicándolas sobre otras análogas, antes del acto de sus bodas, y de este modo estará seguro de obtener de las nuevas semillas unas plantas que se diferencien mas ó menos de la especie á que corresponden ó, lo que es lo mismo, que varien entre sí por caractéres ó notas mas ó menos marcadas y constantes. Esto esplicado, pasemos ya á dar una idea general del método de

sienbra y cultivo que corresponde á las plantas de que estamos hablando.

*Sienbra de las plantas de flores de raices bulbosas y tuberosas.*

Para senbrar las semillas de todas las plantas, comprehendidas en esta seccion, se dispondrán unas eras, cajones ó tiestos, segun la cantidad que haya de simiente y la planta que se desea multiplicar. Estos semilleros deben estar colocados en donde no los ataquen los ratones, las hormigas y demas insectos, como tambien en un parage espuesto al sol; aunque en las sienbras tardías habrá que modificar su accion por medio de lenzones, cubiertas de paja ó de arbustos, ó bien con los portales de jardin. El terreno se conpondrá de la mezcla de una parte de arena gruesa, otra de mantillo muy consumido, y dos de tierra de soto muy ligera, todo ello bien revuelto y preparado con alguna anticipacion para que se amalgamen y combinen entre sí todas las tierras. Hecho así, se allana la superficie, se dispone con la mayor igualdad y se verifica la sienbra cuidando de que la semilla quede bien repartida, cubriéndola despues con una capa de la misma mezcla bien cribada, pero que no pase del grueso de un dedo: en seguida se riega con regaderas de lluvias finas, y se continúa cuidando de darlas el riego y demás que fuese necesario hasta que nazca, en cuyo caso es preciso resguardar las nuevas plantas, así de la fuerte inpresion de los rayos del sol, como de todos los demas meteoros y enemigos que las puedan perjudicar.

En fin, todos los cuidados que exigen estos semilleros, se reducen á mantenerlos linpios de toda yerba, cantos, insectos y demás que pueda dañarles; á *recebar* el cajon, tiesto ó era quando la planta haya crecido, aumentándole un dedo de tierra de la misma mezcla á la cubierta antes prevenida; y por último, á preservarlos de los frios y heladas del invierno, pues aunque, quando son ya crecidas, resisten estas plantas á su inpresion, quando son aun tiernas suelen perecer con ellos.

*Se continuará.*

*Con Real permiso.*

EN LA INPRENTA REAL.