

IDEAL MÉDICO

REVISTA MENSUAL

Anales del Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial
Y DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

DEFENSOR DE LAS CLASES SANITARIAS

FUNDADOR:

DOCTOR M. RUIZ MAYA

Dirección Científica:

Hospital General de Agudos



Dirección Profesional y Administración:


OSARIO, 16 Y 18

II ÉPOCA.-IV TOMO

Córdoba 30 de Febrero de 1925

Año IX. - N.º 92

LAXO
Avena y Plátanos **NUTREINA**



Los resultados de este alimento son verdaderamente sorprendentes, pues no solamente corrige el estreñimiento de los niños, sino que lo cura en la casi totalidad de las atonías intestinales, causadas exclusivamente por una alimentación inadecuada

MUESTRAS A PETICION

DE VENTA EN BUENAS FARMACIAS Y TIENDAS DE ULTRAMARINOS

Sociedad Española NUTREINA, Cardenal Cisneros, 62.- Madrid

Yodalgon

(SIN YODISMO)

Dosis: Adultos, tres cucharadas al día.—Niños, a cucharaditas.

Jarabe con yodo orgánico, soluble y asimilable, con los principios activos de las hojas de nogal, fumaria, «fucus vesiculosus» y sales remineralizadoras — Linfatismo, Escrofulismo, Obesidad, Artritis, Arterio-Esclerosis y enfermedades de la piel.

Jarabe Figrán

Dosis: Adultos, tres cucharadas al día.—Niños, a cucharaditas.

Jarabe con los principios activos de Grindelia robusta, Acónito, Bálsamo de Tolú y Codeína
Enfermedades del aparato respiratorio

Gotas Sanguíneas Royen

Dosis: Ocho gotas antes de cada comida, disueltas en vino o en agua.

Peptonato de hierro, Cuasia y Strophantus.
Poderoso tónico reconstituyente

Clorosis, Anemias, Inapetencias y Convalecencias.

Treponemol

Dosis: Dos de quince gramos al día.

Elixir depurativo, con sales Hidrargírico potásicas.
Contra las Afecciones sifilíticas.

Muestras y Literatura: Laboratorio "HIGIONE"

J. BATLLE. - FARMACÉUTICO

Diputación, 73

BARCELONA

El alimento perfecto para niños
y estómagos delicados

SE DIGIERE SIEMPRE

MALTARINA

AUTODIGESTIVA

Asegura el normal desarrollo del niño, sin el menor trastorno gástrico.

Constituye un tratamiento seguro de todos los procesos de putrefacción, dispepsia, colitis y entrecolitis.

"CEREALINE"

Alimento concentrado. Verdadero extracto de cereales y leguminosa. Sustituye con ventaja a la leche y caldo. Para enfermos, ancianos y niños.

Gran Cruz y Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Génova, 1922

Indicado durante el período de lactancia en los niños. Diarreas verdes. Infecciones gastro-intestinales. Enfermos de estómago. Fiebres tifoideas, etc., y muy especialmente para la mujer durante el período de embarazo.

Laboratorio "CEREALINE"

De venta en todas las Farmacias y Droguerías

"NEUMOCOL"

Preparado a base de **Tiocol, Gomenol, Benzato de sosa, Lactofosfato de cal, Heroína y Jarabe de Eucaliptus**

Premiado con medalla de oro en el Congreso Internacional de la Tuberculosis, en Barcelona, 1910.-Gran premio en la Exposición Internacional de Amberes, 1911

«NEUMOCOL» es insustituible en todas las enfermedades del aparato respiratorio y de efectos altamente reconstituyentes.

Indicaciones principales: Catarros, tos, bronquitis agudas y crónicas, asma, tos-ferina, etc., etc.

LABORATORIO "CEREALINE"

Suero Tónico Estrada

FERRUGINOSO

Arrhenal.	0,05
Gl cerofosfato de sosa.	0 15
Glicerofosfato de hierro.	0,05
Sulfato de estriénina.	0,001
Suero fisiológico c. s. para 2 c. c.	

INYECTABLE TÓNICO-RECONSTITUYENTE
NEURASTENIA, ANEMIA

A. ESTRADA MORALES, Farmacéutico.—Puente Genil

Suero Tónico Estrada

SIMPLE

Arrhenal.	0,05
Glicerofosfato sódico.	0,20
Sulfato de estriénina.	0,001
Suero fisiológico c. s. para 2 c. c.	

INYECTABLE TÓNICO-RECONSTITUYENTE
Antineurasténico de primer orden

A. ESTRADA MORALES, Farmacéutico.—Puente Genil

Terapéutica Moderna de Cal

==== EPIVOMIN ====

Marca una nueva fase en el tratamiento de la EPILEPSIA.
Insustituible en los VÓMITOS DE LAS EMBARAZADAS.
De acción insuperable en los INSOMNIOS.

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

—Tubo, 5 pesetas


El constante aumento del número de sus favorecedores es el mejor testimonio de sus maravillosos resultados.

Literatura y muestras a disposición de los señores médicos.
Propaganda exclusivamente a este Cuerpo.

—Elaboración especial del Laboratorio—

Sanavida.—Apartado 227.—SEVILLA

LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA
Propietario: J. CUSÍ, Farmacéutico. — FIGUERAS-CATALUÑA



Terapéutica Oto-rino-laringológica y Ginecológica

YODASEPTOL LUNA PEREZ

(NOMBRE REGISTRADO)

Afecciones de las mucosas, *Anginas* (de resultados decisivos en las crónicas), *Faringitis*, *Laringitis*, *Amigdalitis*, de éxito seguro en la *Ozena*.

Leucorrea, Vaginitis, Metritis, etc.

DEPÓSITOS PARA LA VENTA AL POR MAYOR EN MADRID

Sres. Pérez Martín y C.^ª, Alcalá, 9 y Sres. E. Durán (S. en C.), Tetuán, 9 y 11

Muestras y literatura gratis a los señores Médicos, previa demanda, al Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas Luna Pérez, Lucena (Córdoba)



Marca registrada

Para curar los dolores NERVIOSOS Y REUMÁTICOS (dolores de cabeza, faciales, intercostales, ciáticos, de los riñones, etc.) y las molestias periódicas propias de la mujer, recetad

CEREBRINO MANDRÍ

Cuya fórmula por cucharadita colmada es:

Aci ester. orto, etanoil benceno metiloico	20 centígr.
Para. acet. fenetidina	15 »
Bromhidrato potásico	5 »
Cafeína	5 »
Extracto flúido de gelsemium sempervidens	5 milígr.

Este producto se elabora por el **Dr. Francisco Mandri**, médico y químico-farmacéutico, en su laboratorio, Escudillers, 6.—BARCELONA.

Imp. Moderna — Córdoba.

Para curar los dolores NERVIOSOS Y REUMÁTICOS (dolores de cabeza, faciales, intercostales, cardíacos, de los riñones, etc.) y las molestias periódicas propias de la mujer, recetar

GERBERINO MANDRI



MARCA REGISTRADA

Cuya fórmula por cucharadita colmada es:

20 centigr.	Acet. ester. orto, etanol benceno metílico
15 »	Para acet. fenetidina
5 »	Bromhidrato potásico
5 »	Caína
5 miligr.	Extracto fluido de <i>gelsemium sempervirens</i>

Este producto se elabora por el Dr. Francisco Mandri, médico y químico-farmacéutico, en su laboratorio, Escudellers, 6.—BARCELONA.

M.D. Mandri — Córdoba

IDEAL MÉDICO

REVISTA MENSUAL

ANALES DEL CUERPO MÉDICO DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL
Y DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS

FUNDADOR: DR. M. RUIZ MAYA

II ÉPOCA.-V TOMO

CÓRDOBA 28 DE FEBRERO DE 1925

NÚM. 92.-AÑO IX

DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

Dr. EMILIO LUQUE MORATA, Decano de la Beneficencia Provincial

CIRUGÍA DE MUJERES

DEL SANATORIO QUIRÚRGICO «LA PURÍSIMA»

CONSEJO DE REDACCIÓN: EL CUERPO DE LA BENEFICENCIA

Dr. Altolaguirre Luna
Profesor agregado de Cirugía

Dr. Gómez Aguado
Tocólogo de la Casa Cuna

Dr. Jiménez Ruiz
Profesor agregado de Oftalmología

Dr. Luque Ruiz
Profesor agregado de Cirugía

Dr. Otero Sánchez
Profesor agregado de la Casa Cuna

Dr. Romera
Cirugía.-Hospital de Crónicos

Dr. Ruiz Maya
Nerviosas y mentales.-Manicomio

Dr. Sánchez Gallego
Profesor agregado de Medicina

Dr. Berjillos del Río
Profesor agregado del Manicomio.-Piel y sífilis

Dr. Gutiérrez Sisternes
Oftalmología

Dr. León Avilés
Profesor agregado de Medicina

Dr. Navarro Moreno
Cirugía de hombres.-Otorinolaringología

Dr. Rodríguez Camacho
Medicina general.-Laboratorio

Dr. Roncal
Medicina.-Laboratorio

Dr. Vázquez de la Plaza
Medicina

Dr. Villegas Montesinos
Medicina operatoria

COLABORADORES:

TODOS LOS COMPAÑEROS DE LA PROVINCIA

SECCION CIENTÍFICA

DIRECTOR: E. LUQUE MORATA

REACCIÓN DE LANGE

POR LOS DOCTORES

MIGUEL JEREZ OLMEDO
Farmaéutico Militar.MANUEL VILEGAS MONTESINOS
Farmacéutico.

De todos son conocidos los rápidos y concluyentes resultados obtenidos con la reacción del oro coloidal en el diagnóstico diferencial de sífilis, tabes, meningitis, etc., operando con el líquido cefaloraquideo. De ejecución facilísima e interpretación sencilla, no ofrece a primera vista más dificultad técnica que la de prepararse el oro coloidal *de color rojo puro sin visos violetas ni reflejos grasos en su superficie*, sin cuyas condiciones, amen de una cuidadosa experimentación previa sobre productos tanto normales como meningíticos, tabéticos, etc., no puede emplearse este sensible reactivo con seguridad en sus resultados.

Fundamento de la reacción

Cuando una suspensión de oro coloidal se deja en contacto a la temperatura ordinaria con distintas diluciones de un líquido cefaloraquideo, sucede: que si el líquido es normal, es decir, perteneciente a un individuo no afecto de las enfermedades enumeradas, la mezcla conserva un color rojo-purpúreo, idéntico al de el reactivo empleado e inalterable durante el período de 24 a 48 horas; no sucede pues la más mínima precipitación del oro. Si la experiencia se practica con un líquido patológico, los tubos variarán de color, tanto más pronto cnanto más intensa sea la reacción, y aparecerán algunos de ellos rojo-violeta, violeta, púrpura, azul, azul claro e incoloro, sin que la concentración del líquido en los tubos guarde relación alguna con el matiz adquirido. Colocando sobre las ordenadas de una cuadrícula las diluciones a que cada coloración se produjo y sobre las abcisas la escala de colores posible, obtendremos en la intersección otros

Ceregumil FERNANDEZ

ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO

Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales

Fernández & Canivell y Compañía.-MALAGA

tantos puntos de una curva, cuyo desarrollo nos llevará rápidamente al diagnóstico diferencial.

Lange explica su reacción suponiendo que una variación cuantitativa y cualitativa del líquido normal provocada por la infección, produce la mutua precipitación del oro-reactivo y los coloides del líquido que se manifiestan por el viraje desde el violeta al incoloro. En realidad es muy difícil deducir la causa de tan singular fenómeno. Esta reacción como la del benjuí, la del mástic y las mismas de Wassermann, Sachs-Georgi, etc., tienen una causa que nos es desconocida y probablemente nos lo seguirá siendo mientras la química de albuminoides da el gigantesco paso de conocer la constitución cualitativa y cuantitativa de estas sustancias, sus características, y sobre todo, la separación del sinnúmero de especies químicas que, englobadas hoy en uno o varios grupos, no tienen más reacciones diferenciales que las de precipitación por las sales, de valor tan relativo como las de disolventes que actúan a veces de igual modo sobre especies químicas muy distantes en el resto de sus propiedades. Mientras nosotros no sepamos caracterizar y separar las albúminas del organismo, no podremos saber las mutaciones que éstas sufren por el estado patológico, y por tanto la explicación científica de las reacciones que nos ocupan, no pasará de la categoría de hipótesis continuamente transformadas para adaptarse a los nuevos hechos observados. Hoy por hoy, solo nos es dable afirmar que ciertas enfermedades infecciosas producen en el organismo modificaciones físico-químicas que podemos sorprender con reacteos y técnica apropiada.

Preparación del oro coloidal.— Método Miller Lavy: : : :

Fundamento: Una solución de cloruro de oro alcalinizada por el carbonato potásico, es reducida en caliente por otra de formaldehído. El oro separado en estas condiciones adopta el estado coloidal con color rojo puro y la pseudo-solución queda estabilizada por el cloruro alcalino formado.

Todos los autores exigen para esta operación cuidadosas condiciones, tanto para la preparación del material, como para la elección de técnica y reactivos; material de vidrio nuevo que sucesivamente se ha de lavar con ácidos, agua corriente, destilada y bidestilada, alcohol y eter, siendo después secado en la estufa y esterilizado por el calor seco; productos químicamente puros de los llamados *pro-análisis* y una técnica seguida paso a paso con rigurosa exactitud. No ha faltado algún prestigioso químico y bacteriólogo que en una conferencia pública atribuyese papel principalísimo al factor suerte, ya que no de otro modo podían explicarse los éxitos y fracasos sucesivos en un mismo

Fluothymina: Dr. Tayá y Dr. Bofill.

experimentador que operaba siempre por la misma técnica e idénticos reactivos y material. Ante tal número de dificultades, la reacción de Lange no sería asequible a todos los experimentadores o no quedaría para algunos más recurso que la adquisición del reactivo preparado con todos los inconvenientes que ello lleva consigo. Esta y no otra ha sido la causa de que no se haya popularizado como merece.

Hemos de hacer constar que a nuestro compañero el farmacéutico primero de Sanidad Militar señor Rogina, se debe el haber reducido el problema a sus verdaderos términos. En el Hospital militar de Coruña donde prestaba sus servicios, consiguió, después de varios tanteos, un producto excelente empleando material cuidadosamente lavado (sólo para evitar su posible reacción alcalina), cloruro de oro pardo de Merk, carbonato potásico cristalizado, formol comercial, agua destilada simple y hasta agua potable filtrada.

De sus trabajos dedujo como condiciones óptimas para obtener un reactivo utilizable: el empleo de soluciones recientes, un grado de alcalinidad conveniente obtenido por valoración previa de la acidez del cloruro de oro con la misma solución alcalina que después se fuese a utilizar, y una limitación apropiada del tiempo de ebullición.

Al tratar nosotros de comprobar este trabajo, hemos encontrado más simplificadas aún las condiciones requeridas. Podemos asegurar que con una mediana práctica general de laboratorio se llega *siempre* a conseguir el reactivo sin ninguna dificultad. He aquí la técnica adoptada por nosotros: preparéanse varios matraces de vidrio lavados previamente, primero con una mezcla oxidante para eliminar todo resto de materia orgánica y después con agua corriente hasta neutralidad, enjuáguese con agua destilada y déjense escurrir o si se aiene prisa tratéense sucesivamente con alcohol y éter para acelerar su desecación. De igual modo preparadas se dispondrán algunas pipetas de 5c. c. y una bureta.

Disuélvase 10 centigramos de cloruro de oro pardo de Merk en 10 c. c. de agua destilada y divídase esta solución en dos partes iguales colocadas en dos matracitos. Por otra parte prepárense 10 c. c. de una solución de carbonato potásico al 2 por 100 e igual volumen de una solución de formol comercial al uno por 100.

Sobre uno de los matraces que contiene la solución de cloruro de oro se añaden unas gotas de fenolftaleína, se lleva a la ebullición y con una bureta se añade solución de carbonato potásico hasta franca alcalinidad en caliente, persistiendo durante diez minutos el color rojo del indicador. Anótese el número de c. c. gastados.

En un matraz de 500 c. c. se vierten dos y medio de la solu-

Fluothymina, Coqueluche, Tos.

ción de cloruro de oro, se diluye con 500 c. c. de agua destilada y se calienta hasta la ebullición; enseguida se vierten los c. c. de solución alcalina necesarios para neutralizarlos (no es necesario medirlo con gran cuidado) y después dos y medio c. c. de la solución de formol. Manteniendo la ebullición de 35 a 40 minutos, se obtiene un líquido rojo obscuro por reflexión, y rojo purpúreo bellissimo por refracción, que por enfriamiento y reposo deja un escaso sedimento de color pardo violáceo que separado por decantación permite ya utilizar el reactivo para ensayos en líquidos cefaloraquideos normales primero, y patológicos ya diagnosticados, después.

El oro coloidal que varias veces hemos obtenido por este procedimiento, ha respondido siempre a todas las exigencias.

En cuanto a los métodos que utilizan la glucosa, la glicerina, el tanino, etc., como reductores no podemos emitir juicio hasta comprobar prácticamente sus resultados.

Técnica de la reacción de Lange

Prepárese en análoga forma a la prescrita para la obtención del oro coloidal varios matraces, una pipeta de Levaditi y dos pipetas graduadas de 5 y 1 c. c. respectivamente. Se necesitan también 13 tubos de ensayo privados de materia orgánica, de reacción neutra, secos y esterilizados.

Obténgase cantidad suficiente de agua bidestilada en aparato de vidrio y con ella unos c. c. de solución de cloruro sódico al 4 por 1.000.

Dispóngase sobre una gradilla 13 tubos de ensayo numerados y viértase en cada uno 1 c. c. de la solución de cloruro sódico; añádanse 0'8 c. c. de la misma solución sobre el tubo 1; tómese 0'2 c. c. del líquido cefaloraquideo a estudiar y viertánse en el tubo 1, mézclase bien y pásese 1 c. c. de la mezcla al tubo 2, de este 1 c. c. al 3, y así sucesivamente hasta el 11 inclusive; 1 c. c. de este último se separa y se tira. Tenemos así una serie de diluciones cuyo título decrece en progresión geométrica, excepto el tubo 12 que contiene solo solución salina y que nos ha de servir de testigo. En seguida añadimos a cada tubo 5 c. c. de oro coloidal, incluso al 13 que también ha de servir de testigo, mezclamos insuflando aire por la pipeta que pasará desde el 13 hasta el 1 y anotamos los resultados observados a los tres minutos, a la media hora y a las 24 horas de reposo a la temperatura ordinaria.

Si el líquido es normal, el color rojo de los tubos permanece inalterado en todos ellos; cuando el líquido es patológico de una afección de las señaladas, sucede, que a los tres minutos, a la media hora o a las 24, según la intensidad de la reacción, se notarán cambios de color comprendidos entre el rojo violeta y el

Fluothymina: *Dr. Tayá y Dr. Bofill.*

azul claro, pasando por el violeta y el azul obscuro. Resta solo observar a qué dilución se produjo cada cambio, y escribir en las abscisas de una cuadrícula la escala de colores dicha, mientras en las ordenadas se anotan los números de los tubos y su dilución, obteniendo así una curva de cuyo exámen se deduce el diagnóstico requerido.

No debe emplearse ningún reactivo que no haya sido previamente comprobado con líquidos normales y patológicos diagnosticados.

Los tubos 12 y 13 deben permanecer inalterados para que la reacción tenga valor práctico.

Consecuencias

El alto valor diagnóstico de la reacción de Lange depende de una parte (enfermedades sífilíticas) de su gran sensibilidad, muy superior, desde luego al Wasserman, y de otra de la posibilidad de distinguir enfermedades muy próximas desde el punto de vista clínico.

No importa en la mayor parte de los casos la mezcla con sangre del líquido cefaloraquídeo que se ensaya.

Como vemos por lo que llevamos anotado, no presenta dificultad alguna la práctica de esta reacción, incluso la preparación del reactivo que bien conducida es de resultados completamente seguros.

Interpretación de los resultados

Enfermedades sífilíticas.—Se caracterizan por lo que llama Lange «punta de sífilis», es decir, que el máximo de precipitación del oro corresponde a las concentraciones más fuertes y oscila entre el (1:40) hasta el (1:640).

Hay pues, una fuerte desviación a la derecha que se manifiesta en la curva por un rápido descenso a partir del tercer tubo (1:40) hasta el séptimo tubo (1:640), siguiendo recta hasta el final.

Esta curva-tipo presenta, no obstante, modalidades propias de cada afección sífilítica. Así, en la sífilis secundaria con irritación meníngea, los tubos tres y cuatro aparecen violetas, y rojos los demás, quedando reducida la punta de la sífilis a su más mínima expresión.

En la tabes, el tubo número 1, aparece inalterado; rojo azulado o violeta, el 2; azul claro, el 3 y el 4; violeta el 5, y rojos los demás.

La sífilis cerebroespinal, produce una curva que es netamente tabética inmediatamente después de verificada la reacción, pero observada a la media hora, presenta una total e intensa desviación a la izquierda, apareciendo azul claro los 5 primeros tubos, azul el 6, violeta el 7, y rojos los demás.

Fluothymina: *Tos ferina, Tos espasmódica, Tos de los tuberculosos.*

La parálisis general, presenta la más amplia desviación a la izquierda, todas las diluciones menores de 1:1280 aparecen incoloras, mientras esta última queda azul y las demás inalteradas.

Enfermedades meningíticas.—Todas ellas ofrecen fuerte desviación a la derecha, es decir, que las mayores precipitaciones corresponde a las mayores diluciones.

Meningitis infecciosa (purulenta).—Los tubos 1 al 6 inclusive quedan rojos, el 7 y el 8 azulado violeta, el 9 y los demás inalterados.

Meningitis tuberculosa.—El tubo 6 y el 7 aparecen violetas y rojos los demás.

Las Paquimeningitis, las meningitis infecciosas, serosas y alguna otra variedad de esta afección, dan reacción de Lange negativa.

Córdoba, Febrero 1925.

LA PIEL EN EL ORGANISMO

POR EL DR. D. FRANCISCO BERGILLOS

(CONTINUACIÓN)

Vacuoterapia en Dermatología

Las dermatosis microbianas, como todas las enfermedades infecciosas, son tributarias de los procedimientos terapéuticos de vacunación.

Pero esta rama de la medicina, tiene una fisonomía propia, especial y característica, en lo que a infecciones se refiere.

El estafilococo, por ejemplo, al llegar como germen patógeno a tomar carta de naturaleza en la superficie cutánea, no causa siempre la misma enfermedad.

Es huésped ordinario de toda epidermis, en la que vive como inocente y pacífico habitante y aun en la piel más cuidada y limpia encuentra raíces pilosas, glándulas sebáceas y escamas epidérmicas que le sirvan de excelente albergue.

No es, de ordinario, un perverso y malévolo inquilino que enferma y perjudica al huésped en que se alberga, pero es siempre

CEREALES ESTRADA

EXTRACTO DE CEREALES Y LEGUMINOSAS CONCENTADO

E INALTERABLE DE GRAN PODER ALIMENTICIO

NO PRODUCE FERMENTACIONES INTESITNALES

un enemigo expectante, que sabe aprovechar cualquier solución de continuidad en las epidermis, cualquier debilitación del organismo que le cobija, o cualquier agresión de otro microbio, para tomar carta de naturaleza como gérmen piógeno que produce por sí lesiones o que complica las que otros han producido.

Al estafilococo son debidas diferentes afecciones como el impétigo de Bockhard el eczema impetiginoso, las foliculitis, las sicosis, la forunculosis y el antrax.

A su asociación o convivencia con otros gérmenes, el impétigo vulgar, el ectima, multitud de úlceras atónicas, varicosas o no, el acné pustulosos, el onixis impetiginoso y la mayoría de los eczemas microbianos.

Es el estafilococo, un microbio de tan fácil cultivo y reproducción, y tiene tanta facilidad para pulular y meterse en todas partes, que seguramente en un tanto por ciento muy elevado de las dermatopatias, interviene para producir cuadro morboso o para prestarle fisonomía especial con su presencia.

Pero esta diversidad de afecciones producidas por un mismo microbio de tan diferente aspecto clínico, son a la vez tributarias de distinto tratamiento, dándose el caso paradójico de ser completamente ineficaz para el impétigo de Bockhar, por ejemplo, la vacunación estafilocócica, tan útil y eficaz en la forunculosis.

Para nosotros, este efecto paradójico de la vacunación en las estafilococias, tiene una explicación sencilla y clara en la teoría recientemente sustentada por el profesor Besredka, de la inmunidad local sin anticuerpos, de la que nos ocuparemos algo más detenidamente al final de este trabajo.

Al tratar, pues, de la vacunación en las estafilococias, sólo hemos de referirnos a la forunculosis, ya que es la única enfermedad producida por este gérmen que se beneficia de una manera segura y positiva del genial tratamiento introducido en la terapéutica por Wright.

La vacuna, bien sea de estafilococos solos, bien de estafilococos con otros gérmenes o bien de microbios del propio enfermo, es un tratamiento que aplicado a su debido tiempo, con indicaciones precisas, en las dosis convenientes y con el intervalo justo entre cada inyección, nunca deja de producir resultado.

Pero ¿qué hemos de preferir, una vacuna estafilocócica comercial o la autovacuna? La mayoría de los dermatólogos se inclinan, con justa razón a la autovacuna.

No falta, sin embargo, quien como Manté distingue entre los efectos terapéuticos de la Stok vacuna comercial y la autovacuna estafilocócica.

Para Manté, el efecto de la Stok vacuna, es realmente curativo de la forunculosis, mientras que la autovacuna, es solo de efectos preventivos y por eso él comienza el tratamiento con la primera, y cuando con ella ha conseguido la curación, continúa el tratamiento

Fluothymina: *Coqueluche, Tos.*

PRODUCTOS NACIONALES

Quimioterapia Bacilocócica de Koch
por la Cinameina colessterinada

 **LUZON** 

Medicación hipodérmica paraespecífica y profiláctica de las bacilosis locales, de resultados muy satisfactorios y casi siempre de curación clínica en los comienzos evolutivos de los procesos bacilocócicos bajo sus formas septicémicas o tifo-bacilocócicas de Landouzy y Anatómica o de evolución lenta

AMPOLLAS DE 3 C. C. (con y sin gomenol)

RECALCIFICANTES **LUZON**

ADRENALINADO - METILARSINADO - METILAR
SENIGLUCOSADO -.- RECALCIFICANTE (SOLO)

Preparado en discos. DOSIS: Tres al día

Ampollas LUZON

para RAQUIENESTESIA

Cada ampolla contiene diez centg. de estovaina en polvo

Especialidades **LUZON**

Reyes Católicos, núm. 40, principal. - GRANADA



YODALOL LINDE

Combinación orgánica yodo-albuminoidea en la que la molécula proteica no ha sido modificada, acusa las reacciones de biuret y de Millon.

GOTAS E INYECTABLES

CADA CENTIMETRO CUBICO CONTIENE 5 c.g. DE YODO PURO.



FRASCO DE 45 CC.

CAJA DE 12 AMPOLLAS A 1 CENTIMETRO CUBICO

VENTA EXCLUSIVA EN LAS FARMACIAS.

MUESTRAS:

SU AUTOR

**JOSE DE LA LINDE
CORDOBA**



Office

EL ARCO IRIS

José Chinchilla Alonso

DROGAS, PINTURAS
Y ORTOPEDIA



APÓSITOS - ARTICULOS DE HIGIENE
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS Y PERFUMERÍA



PRECIOS SIN COMPETENCIA

LIBRERÍA, NÚMEROS 15 Y 17

CÓRDOBA

FARMACIA
DEL
Doctor G. Escrivá

Extenso surtido en alcaloides, glucósidos productos naturales y sintéticos, preparaciones galénicas y oficiales

Quata celulosa, Tronsseaux para partos, almohadas absorbentes, algodón enrollado y comprimido, apósitos esterilizados, gasas y vendajes especialmente preparados

Extractos estabilizados, Collobiasas, Gránulos, Inyectables y preparaciones especiales de la casa Dausse

Productos Parke Davis; preparaciones de Euthymol, de Adrenalina, de Taka Diastasa, de Cloretona, Vacunas bacterianas, Filacógenos, Veratrona, etc.

Sueros, Vacunas y preparaciones opoterápicas de diferentes marcas

Preparaciones farmacéuticas de Kalle, Merk, Schering, Zimmer, Knoll, Borroughs Wellcome, Bayer, Ciba, Vigier, Cotoureaux y otros

Calle San Pablo, números, 3 y 5
(PLAZA DEL SALVADOR)

Elixir Veronal

DOSIFICADO

POR EL DOCTOR BUSTAMANTE

Hipnótico español, el más seguro e inofensivo de todos
:: sus similares extranjeros ::
De sabor agradable, acción suave, absorbiéndose en el
:: intestino sin acumularse ::

Depósito: Dr. BUSTAMANTE.-PORTUGALETE (Bilbao)

Muestras gratuitas a la Clase Médica _____
_____ Venta en Farmacias y Droguerías

FARMACIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS

DEL _____

Dr. Manuel Villegas

Análisis de orinas, sangre, jugo gástrico, líquido cefaloraquídeo, pus, esputos, heces fecales, anginas, heridas.

Reacciones de Wasserman, Calmet y Massol, Rodillon, Lange, Noguchi. Sero-diagnósticos Widal-Chantemesse.

Análisis de vinos, leches comerciales, leche de mujer, cervezas, licores, azúcares, harinas, tierras, abonos, aceites minerales y vegetales, etc.

Auto-vacunas Wright.

Especialidades farmacéuticas, esterilización.

Trousseau para operaciones y partos, embalsamamientos. — Productos químicos y farmacéuticos purísimos. Aguas minerales.

Gondomar, 8

CÓRDOBA

Teléfono 90

de seguridad con la autovacuna. La vacuna curativa, la emplea siempre en inyección intravenosa.

El genial Sabourand, sostiene en cambio, que la única vacuna curativa de acción cierta en la tuberculosis y el antrax es la autovacuna, apoyándose para hacer esta afirmación en 10 años seguidos de estudios de esta clase de vacunación.

En el tomo primero de la nueva serie de «Entremes Dermatológico», que acaba de publicar, describe cómo prepara él, de una manera buena y rápida las autovacunas, con las que tan brillantes resultados obtiene.

Emplea como medio de cultivo rápido y floreciente del estafilococo, la fórmula de Noiré, que es como sigue; agua destilada, 1.000 gramos; peptona, 20; glucosa, 20; lactosa, 40; urea, 4; cloruro de sodio, 2'50; agar-agar C. S. 1'60, a 2 para solidificar.

En este medio el desenvolvimiento del cultivo es triple del obtenido en los medios ordinarios.

Para obtener la autovacuna usa siempre tubos de ensayo de 18 centímetros de longitud y 18 milímetros de diámetro, este es un detalle importante sobre el que llama la atención.

Abierto un forúnculo se hace la siembra de pus en cinco tubos, sobre toda la superficie y se llevan a la estufa a 37°.

A las 24 horas hay en todos los tubos unas colonias de estafilococos que cubren toda la superficie, dispuestos a servir.

Para recoger los cultivos no usa nunca el hilo de platino porque araña la gelosa y mezcla a la vacuna pequeñas porciones que habrá que separar después.

Emplea la punta de una pipeta gruesa cerrada a la lámpara y con ella mediante un rascado suave recoge la masa microbiana, procurando no tocar al terreno del cultivo.

Esta masa microbiana se lleva a un tubo de ensayo de las dimensiones antedichas que contenga 20 c. c. de suero fisiológico al 6'50 por ciento, en la que se diluye los microbios sin agitar el tubo, sino moviendo la pipeta sobre la pared del mismo para evitar que se formen grumos.

Y aquí viene la parte delicada de la operación.

Se continúan agregando nuevas cantidades de microbios, procurando siempre mezclarlos muy bien, hasta que estando colocado a contra luz, no se distinga casi nada (palabras textuales) un dedo apoyado en el lado opuesto del mismo.

Parece bastante grosero e impreciso este solo dato para la dosificación de los gérmenes, pero el mismo Sabouraud, agrega textualmente a este propósito.

«Esta indicación de técnica parece bien aleatoria. La experiencia muestra, sin embargo, que ella es suficiente y con un poco de hábito y sirviéndose siempre de un tubo de 18 milímetros de diámetro, se llega a no hacer un error de más de 500.000 unidades microbianas en c. c., lo cual es prácticamente suficiente».

Elixir J. Polo Polibromurado,

Histerismo, ataques epilépticos, etc.

Lab. «Xiela», Prado, 15, Madrid.



Bronquitis-Faringitis Tonsilitis-Laringitis Crup-Resfrios

ceden rápidamente a las aplicaciones de
ANTIPHLOGISTINE caliente.

CORIZA-RENITIS

Las Inflammaciones Catarrales Agudas de las vías respiratorias superiores comunmente llamadas catarro o "resfrío" ceden pronto y efectivamente a las aplicaciones de

Antiphlogistine
TRADE MARK

caliente sobre toda la región pómulo nasal.

La Antiphlogistine reduce la inflamación de la membrana mucosa septa y de las espirales en las cavidades inferiores nasales; se afloja la secreción irritante, y desaparece rápidamente la sensación desagradable de obstrucción, la sensación de "atascamiento" y el dolor de los senos frontales.

Antiphlogistine se vende en todas las droguerías principales.

Se envían muestras y publicaciones al pedirse.

The Denver Chemical Mfg. Co., New York, U. S. A.



Una vez hecha la suspensión microbiana, se deja en reposo un cuarto de hora, para que caigan al fondo los grumos y partículas fibrinosas o purulentas que sirvieron para la siembra, y se reparten los 20 c. c. en 20 ampollas esterilizadas, que se cerrarán a la llama y se calentarán en baño maría durante una hora, a una temperatura de 62 a 65 grados, quedando preparada la vacuna.

Para su uso se empieza a inyectar $1/4$ c. c. en la primera inyección y $1/2$ c. c. en la segunda, $3/4$ en la tercera y un c. c. en la cuarta y siguientes, poniéndolas intramusculares, de preferencia en la región deltoidea y a razón de dos en semana.

Desde la cuarta inyección, la forunculosis se detiene, pero la experiencia enseña que son necesarias de 10 a 14, según los casos, para tener un resultado estable.

Cuando en la quinta no ha aparecido ningún nuevo forúnculo, con 16 inyecciones es suficiente.

Hemos estudiado con algún detenimiento este proceder de Saboraud, porque es, hasta la fecha, el de resultados más seguros, pues según su autor, que lleva muchos años practicándolo en los individuos cuya edad no llega a los 50 años, no falla jamás el procedimiento, consiguiendo la desaparición definitiva de la forunculosis desde la cuarta dosis, sin que nunca haya visto caso de reproducción.

En los individuos mayores de 50 años, obtiene de ordinario los mismos resultados, pero en algunos son menos perfectos y casi siempre más lentos los efectos.

Ya vemos pues, como en la forunculosis los efectos de la vacuna-curativa, son verdaderamente maravillosos, y de ahí que nos sorprenda que esta vacuna no tenga la misma eficacia en las otras dermatopatías estafilocócicas.

Tampoco en las estreptococias cutáneas tiene acción ninguna la vacuna específica. Este germen, que con tanta frecuencia produce enfermedades de piel, es el causante, aparte de la erisipela que se considera hoy enfermedad general y las linfoangitis y flemones que son de orden quirúrgico, del impétigo de Tilbury Fox, los ectimas, las úlceras de las piernas y multitud de piodermitis vespiculosos y eczemas intriguinosos, considerados hasta hace poco como discrásicos o producidos por hongos parásitos.

Para el inglés Levinsohn, multitud de eritemas nudosos de etiología obscura o desconocida, son debidos al estreptococo.

Pues bien, entre tantos y tan diversas enfermedades de piel como el estreptococo puede producir, no encontramos una sola que obedezca al tratamiento específico por la vacuna, por lo que en la actualidad ha sido abandonado por completo.

Pero si esto ocurre con las estreptococias cutáneas, otra cosa muy distinta pasa con la tuberculosis de piel.

El bacilo de Koch, al localizarse como germen patógeno en la piel y mucosas, es causa de un gran número de dermatopatías.

Elixir J. Polo Bromoyodurado, *Gran sedante nervioso.*
Lab. «Xiela», Prado, 15, Madrid.

En efecto, el lupus vulgar, las tuberculosis cutáneas, verrugosa, fungosa, ulcerosas y el goma tuberculoso, son enfermedades en las cuales puede comprobarse siempre la existencia del bacilo, no sólo por el examen directo, sino además por inoculación en los animales.

En cambio, hay otras enfermedades de piel, de indudable origen tuberculoso, como el lupus eritematoso, los sarcoides, el eritema indurado, en los cuales no puede comprobarse la presencia del bacilo de Koch, ni es positiva casi nunca la inoculación a los animales, pero las circunstancias etiológicas, la marcha clínica, el terreno en que se desarrolla y el aspecto anatómo-patológico de las lesiones, son tales, que tuberculosis cutáneas se consideran, y con el nombre de Tuberculides se designan.

La tuberculina antigua de Koch, es decir, la suspensión glicerinada de bacilos tuberculosos, fué empleada por su autor, con grandes esperanzas como tratamiento de toda clase de tuberculosis, y desde el principio la usó contra el lupus vulgar.

Los resultados con las dosis masivas en que empleaba el producto, fueron verdaderamente lamentables; reacciones locales intensas, generalización del lupus, reacciones generales violentísimas y brotes tuberculosos viscerales de forma rápidamente mortal.

Estos gravísimos trastornos hicieron que este proceder terapéutico fuese abandonado en absoluto, pero desde hace algún tiempo, las tuberculinas han vuelto a estar en boga, aunque ya en dosis ínfimas, y escogiendo cuidadosamente los casos a tratar por conocerse ya las contraindicaciones del medicamento.

En la actualidad se comienza la vacunación con tuberculinas mediante la inyección subcutánea 1/1.000 de miligramo, y se repite la inyección cada semana en dosis muy lentamente progresivas y con una atenta vigilancia del paciente, con objeto de suspender tratamiento o disminuir la dosis en cuanto aparezcan reacciones febriles de alguna intensidad.

La literatura dermatológica de estos últimos años, está plagada de observaciones diversas de los efectos producidos por el tratamiento tuberculino, solo o asociado a otros medicamentos en todas las tuberculosis o tuberculides de piel.

Los efectos obtenidos por los experimentadores de todos los países, son verdaderamente alentadores, hasta el punto que en la actualidad el uso de las tuberculinas en dermatología, es corriente para todos los especializados.

El tratamiento se inicia por la dosis de una milésima de miligramo, después 2, 5, 8... luego una centésima de miligramo, 2, 5, 8, más tarde 1, 2, 5, 8 décimas de miligramo para llegar si la tolerancia es perfecta a la dosis de un miligramo de inyección. Se puede ir más deprisa y saltar algunas dosis, cuando las anteriores han sido bien soportadas.

Las inyecciones pueden ser hechas intramusculares o subcutá-

Eczemacura, *Herpes, eczema, granos, etc.*
Depósito: Laboratorio «Xiela», Prado, 15, Madrid.

Productos "Ibys"

Con motivo de la actual epidemia gripal, recordamos a los señores médicos nuestros productos que a continuación se mencionan:

Sueros

Bronconeumoserum

(Suero neumodiftérico optoquinado)

Suero antineumocócico

Suero antidiftérico

Adrenoserum

(Suero equino adrenalínico)

Suero normal equino

Vacunas

Agriptol

(Vacuna antigripal) preventiva

Agriptol

(Vacuna antigripal) curativa



Pídanse muestras y literatutra a "IBYS"

Bravo Murillo, 45. - MADRID

Apartado de Correos 897

Dirección telegráfica y telefónica "IBYS"

Laboratorios Font, Paseo de Gracia, 49, Barcelona

NEUROSOL FONT

TÓNICO RECONSTITUYENTE GRANULAR.—Composición: glicero-fosfato de cal, ídem de sosa, extracto nuez-kola y cacao. Variedades: con y sin glicerofosfato de hierro, con arrhenal y con ác. nucleínico s/ hierro. Usos-dosis: una medida del tapón equivalente a una cucharadita, dos o tres veces al día, según prescripción facultativa.

TRIDIGESTIVO FONT

DIGESTIVO GRANULAR —Composición: fermentos activos de pepsina-pancreatina-diasatasa maltina. Variedades: simple y con fosfato tricálcico. Dosis: la misma que el anterior.

LAX

CONTRA EL ESTREÑIMIENTO, REEDUCADOR DEL INTESTINO.—Composición: agar-agar, seleccionado en polvo impalpable. Variedades: polvo simple, sellos c/ cáscara y sellos c/ belladona. Usos- dosis: póngase en un vaso seco media o una cucharadita de Lax, una de azúcar, un chorrito de agua, y agítese, con lo que se conseguirá como una merienda agradable para tomar al acostarse

LAXOGELOSA

MISMAS INDICACIONES QUE EL ANTERIOR.—Composición: agar-agar, seleccionado en escama diminuta. Variedades: simple y con cáscara sagrada Usos-dosis: una cucharadita, dos o tres veces al día, mezclada con alimentos blandos. Déjese reblandecer media hora en un vaso por partes igua es de agua caliente (no hirviendo).

Espel. representadas: Bi-Palatinoides-Renaglandina-Nebolinas-Metramina-Osceose-Enteroseptyl-Morubiline

==== Centro Técnico Industrial ====

de Productos Químicos y Farmacéuticos

Droguería general

Medicinal e Industrial

PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS

ORTOPEDIA, INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO,

— PERFUMERÍA, SUEROS Y VACUNAS —

Calle María Cristina, número 1.—CORDOBA

TELÉFONO NÚM. 287

neas, pero de preferencia en las proximidades de la lesión a tratar.

Cuando las inyecciones son puestas en sitios en que el tejido celular es abundante y flojo, no se produce ninguna induración ni nudosidad, pero puede aparecer cuando se escogen sitios en que el tejido celular es pobre, como sucede, por ejemplo, en la parte inferior de la pierna.

En estos sitios se forma un nódulo, que recuerda en un todo al eritema indurado de Bazin.

La inyección se hace ordinariamente cada cuatro días pero si se presenta malestar, náuseas, inapetencia, epístaxis, exantemas o púrpura, es conveniente distanciarlas más o disminuir la cantidad, repetir la dosis inyectada anteriormente o aun otras menos elevadas.

Aunque, muy raramente, puede aparecer algunas veces, a nivel del sitio inyectado, un infiltrado inflamatorio, terminado a veces en una vexícula; en otras ocasiones, puede haber inflamación de los ganglios correspondientes, y, aun otras veces, se observan hinchazones inflamatorias o edematosas en los focos de las lesiones tuberculosas.

Las inyecciones de tuberculinas pueden provocar, por sí, toda clase de tuberculides que no existían, como ha observado Jadasshon, Brocq, Milian, Alvarez, Jeanselme y Burnier, pero continuando con las tuberculinas, estas nuevas lesiones desaparecen a la vez que la que se tiene en tratamiento.

Jeanselme y Burnier, en una estadística de casos tratados por tuberculinas que presentaron en la sección de la Sociedad Francesa de Dermatología y Sifiliografía celebrada el día 12 de Junio último, citan el caso de un enfermo en el que aparecieron una docena de pápulas de líquen scrofulosorum en la parte inferior del muslo, por haber recibido en la pierna una inyección de tuberculina destinada a tratar una úlcera tuberculosa.

La úlcera y el líquen curaron perfectamente, por la continuación del tratamiento.

Hé aquí la estadística presentada, que es bien demostrativa del efecto de la vacunoterapia tuberculínica en dermatología.

Tres úlceras tuberculosas de la pierna, una de ellas del tamaño de una moneda de cinco pesetas, que había sido tomada como sífilítica y tratada con éxito con arsenobenzol. Todas curaron, con cicatriz perfecta, con 8 a 16 inyecciones de tuberculina.

Quince casos de eritema indurado: ocho no ulcerados, curados los ocho con 4 a 8 inyecciones, y dos ulcerados, curados también por cicatrización en 2 o 3 inyecciones.

Diez casos de tuberculides papulo-necróticas y lupus-pernio (sabañón tuberculoso): cuatro mejorías notables con 6 a 10 inyecciones, cinco curaciones con 4 a 14 inyecciones y un fracaso (sabañón ulcerado del índice, que no se modificó con 12 inyecciones).

Tres casos de acnitis, curados los tres con 15 a 20 inyecciones, pero se reprodujeron al año siguiente.

Eczemacura,

Herpes, eczema, granos, etc.

Depósito: Laboratorio «Xiela». Prado, 15, Madrid.

Dos parapsoriasis, tratados con tuberculinas asociadas al arsenobenzol: uno notablemente mejorado y otro de resultado nulo.

El resultado de esta estadística no puede ser más halagüeño para el resultado de la tuberculinoterapia, sobre todo aplicada a las tuberculides más que a las afecciones verdaderamente tuberculosas, como lupus.

De todas formas hay mucho que esperar de este procedimiento terapéutico, y más ahora, en que la esmerada preparación de las tuberculinas, la perfecta dosificación y la facilidad de transporte en ampollitas cerradas y enumeradas, las ponen en manos de todos los prácticos que, usándolas prudentemente y con vigilancia, saben que pueden manejarlas sin peligro alguno sus enfermos.

(CONTINUARÁ)

NOTAS CLINICAS

POR EL DR. GÓMEZ AGUADO

En esta época científica actual de *super-novedades* y *super-actualismos*, se recomienda dar una nota escrita, por modesta que sea, de cualquier hecho que se pretenda hacer constar.

Aunque esta práctica se refiera sobre todo a los hechos de investigación personal para poder acreditarlo en todo tiempo, y en este sentido el consejo ha sido escrito hasta por nuestro insigne Cajal, no está de más en este momento actual médico en que tanto se prodigan toda clase de comunicaciones, hacerlas, aunque sean pequeñas y breves, de todo cuanto la práctica le enseñe a uno de alguna utilidad para los demás y para uno mismo.

A todos nos ha sucedido despreciar por insignificantes, cosas u ocurrencias que luego ha visto uno reproducidas como novedades. Ahí va un ejemplo bien modesto: hace un par de años se me ocurrió a mí hacer análisis de sangre (reacción Wassermann) utilizando sangre de cordón placentario, con cuyos análisis se indudable que obteníamos a un mismo tiempo datos de diagnóstico referidos a la madre y al niño.

Al poco tiempo de yo ejecutarlos, leí en una revista médica el procedimiento de Fulanito, de investigación de Wassermann en sangre de cordón, y menos mal que el Fulanito en esta ocasión era un médico español y por cierto gran amigo mío y notable profesional y para mayor honor suyo no era él quien se aplicaba el nombre del procedimiento, sino que se lo aplicaban.

Pero, a mí no se me ocurrió pensar que una cosa tan baladí, constituyese nombre ni procedimiento.

Indudablemente debemos todos dejar registrados las cosas

Raquimiol, *reconstituyente recalificante, anemia, debilidad, etc.*
Depósito: Laboratorio «Xiela». Prado, 15, Madrid.

dignas de ello que encontremos en nuestra práctica y es indudable también que los españoles, a fuer de serios (aunque otra cosa se nos crea por el mundo) y por culpa del ¿orgullo? de nuestra nobleza publicamos poco, por la razón sencilla de que cuando lo hacemos queremos que sea bueno. Y *hay que ver* lo que nos mandan de allende las fronteras. El tupé que tienen tantos señores que nos mandan esos *refritos* sin fin que leemos diariamente...

Después de este preámbulo mis notas clínicas van a resultar el parto de los montes, pero confesando por anticipado que son cosas pequeñas y nimias (lo que en Andalucía llamamos un *pego*), no ha lugar a engaño.

Un accidente raro en obstetricia

Refiérese a una primípara joven que sin ninguna cosa de particular tuvo su parto y alumbramiento completamente fisiológicos y que en un estado de completa tranquilidad fué dejada por una de las Profesoras que la asistió en la Casa de Maternidad.

A la media hora de tiempo comenzó la parturienta a quejarse de algún dolorcillo análogo al de parto, cuyo dolorcillo fué aumentando en tal grado que a la hora y media o dos horas, llegaba a un paroxismo de dolor que arrancaba gritos a la mujer como un dolor expulsivo constante, y que motivó mi rápida llamada.

Lo que primero pensé fué en los vulgares *entueritos*, las contracciones uterinas de las multíparas, pero recordando que era una primípara y muy joven (no tenía 18 años) no me lo explicaba muy bien, al discurrir todo ello mientras me preparaba a reconocerla.

Por palpación abdominal reconocí que útero estaba contraído, perfectamente duro, en su sitio y en completa normalidad. No acusaba la mujer dolor abdominal, sino en la región sacrocoxigea.

Reconocido su aparato genital, lo primero que me interesó fué la observación de periné, en el que ví que no había ninguna rajadura ni rasguño.

Por vulva ligeramente entreabierta asomaba como un coágulo grande de sangre. Rebordée con dos dedos entrados en vagina todo aquel cuerpo extraño, pensando en la posibilidad de algún gran cotiledón placentario o formación de placenta o anejos. Aprecié que estaba bastante libre. Introduje un poco más la mano al mismo tiempo que hice con mano izquierda una ligera expresión uterina y fué expulsada inmediatamente una masa de forma piriforme, de tamaño superior a media cabeza de feto, y

Raquimiol, *reconstituyente recalificante, anemia, debilidad, etc.*
Depósito: Laboratorio «Xiela», Prado, 15, Madrid.

los dolores de la mujer cesaron por completo y en absoluto en aquel mismo momento.

La masa expulsada tenía, como digo, la forma de una pera perfecta y muy geométrica; tenía su superficie lisa y como pulida en toda su extensión, excepto por la parte más estrecha, en el sitio por donde asomaba por la vulva.

Disociada aquella masa, comprobé que no era más que un coágulo de sangre del gran tamaño dicho.

Este coágulo, durante todo ese rato después del parto estuvo alojado en vagina, a la que estaba dilatando, y de ahí el dolor coxigeo.

Para mí constituye este hecho un accidente en partos, bastante raro, que no he visto en mi práctica ni leído en libros corrientes.

Discurriendo sobre él, no me explico bien su formación. Si se formó primitivamente en vagina no me explico cómo se detiene allí la sangre en esos momentos *post-partum* para formarse y llegar a ese tamaño. Y si el coágulo ha sido formado en útero (por su forma así parece) al ser expulsado de matriz en una contracción, también parece raro que se detenga en vagina y allí provoque ese dolor, esa dilatación y no termine su expulsión al exterior.

No pretendemos más que dar cuenta de la observación y por tanto sobran ya más comentarios.

En Medicina los problemas de diagnóstico y por tanto de tratamiento, se aclaran merced a los recursos de la exploración clínica

Esto que pudiéramos llamar una perogrullada, se nos vino a las mientes ante un caso que hemos asistido hace pocos días en nuestro servicio oficial con la valiosa colaboración del estudioso joven Dr. Enrique Luque.

Se trata de una mujer múltipara que en su historia tokúrgica había dos o tres aplicaciones de forceps y tres presentaciones de nalgas con intervención médica. Esta historia un poco trágica, fué la que incitó un poco sugestivamente a su médico general a enviar a la enferma, ante las primeras dificultades, en busca de especialistas.

Comenzaron los dolores de parto a las doce del día, rompió su bolsa amniótica a las seis de la tarde. A nosotros nos la llevan a las nueve de la mañana del día siguiente.

La mujer cree que su embarazo es de término. Por reconocimiento se aprecia de volumen como de unos ocho meses y por palpación parece notarse cabeza fetal en parte superior e izquierda de útero, de lo que parece deducirse una presentación de nalgas una vez más.

Vaselatum, *Específico de la atonía intestinal.*
Depósito: Laboratorio «Xiela». Prado, 15, Madrid.

Es un hecho notorio que las preparaciones de propiedad de dudosos méritos, cuentan al menos con el apoyo de algunos miembros de la profesión médica. Es verdad, sin embargo, que esta práctica está siendo abandonada rápidamente, pues los médicos de hoy necesitan mucho más que la simple palabra del manufacturero de que la preparación ofrecida es digna de su apoyo. Las preparaciones médicas que no tienen verdadero mérito, pueden alcanzar importancia con una intensa propaganda, pero solamente por corto tiempo, pues los médicos honorables pronto separan la falso de lo verdadero.

El tiempo es el que realmente muestra el mérito. Cuando una preparación ha sido usada por los médicos durante treinta años y cada año se ha ido empleando en mayores cantidades, y la profesión en todo el mundo civilizado la acepta como un importante y autorizado auxiliar en su equipo, no puede haber duda acerca de la eficacia de tan extraordinaria preparación. Tal remedio es Antiphlogistine, empleada diariamente por muchos miles de médicos en todas partes del mundo en el tratamiento de todos los casos en que haya inflamación y en que sea necesaria una cataplasma antiséptica, higroscópica y osmótica.

Ahora se está llamando la atención de los médicos de España hacia la Antiphlogistine, por medio de las columnas de anuncio en la prensa médica, y los lectores de este periódico quedan invitados a dar a esta preparación el ensayo a que por su fama se hace acreedora.

Este producto se encuentra en la mayor parte de las droguerías de importancia y muestras gratis serán enviadas a cualquier médico que lo solicite a la Denver Chemical Mfg. Co., 20 Grand Street, New York City o al Laboratorio de esta casa en Barcelona.

BACILINA BÚLGARA

Fermento láctico puro y vivo, de conservación limitada. Cada frasco lleva indicado en la etiqueta el tiempo en que debe ser utilizado.

INDICACIONES: Gastro-enteritis infantiles y en general en toda infección intestinal de adultos.

INSULINA

Gran éxito conseguido en cuantos casos ha sido empleada.

Laboratorios P. GONZALEZ y M. SUAREZ

TAMARIZ, 191, 1.º, 1.ª—BARCELONA

Muestras y literatura a los señores Médicos.—De venta exclusiva en Farmacias.

Las Grandes Terapéuticas

Tetra-Proteín "Celsus" El gran producto español. El más perfecto y clínicamente más acreditado preparado proteínico de que dispone la medicina. El primero y único a base de leche cruda, mixta, aséptica, desgrasada, en forma estable, con completa integridad de sus distintas proteínas, más deuterio-albumosas B. Por ser proteínas varias, el efecto proteínico es múltiple y graduado, sin jamás choque proteínico. Por no estar desnaturalizadas por cocción o esterilización o por sustancias químicas, son desintegrables por entero y rápidamente por los enzimas de los plasmas y tejidos orgánicos, no pudiendo producir proteinuria, ni caseinuria, como los preparados de caseína. Caja de 6 inyectables de 5 cent. cúb. USO: Medio o un inyectable cada dos o cuatro días.

Ampliación y variación de los efectos de la TETRAPROTEIN «CELSUS» se obtiene con:

Poli-Bacterium "Celsus" Vacuna omnivalente para tratamiento proteínico bacteriano de todas las infecciones.

Dermo-Proteín Celsus Pomada de proteínas para aplicación de éstas por la piel : : :

Leche cruda estabilizada Celsus Leche cruda en polvo para preparar en todo momento leche natural.

Terpenos Celsus Para la terapéutica de estímulo : : :

Consúltense los tratados de proteinoterapia: Martinus Ziesche, Editorial Mariano Roig, y de Petersen, Calpe, Madrid, o de Noguer Molina, o pídanse las publicaciones del INSTITUTO LATINO DE TERAPÉUTICA S. A.

Cutina Anti-tuberculosa Wolff-Eisner Celsus Pomada para el tratamiento preventivo y curativo de la tuberculosis por fricción cutánea de tuberculina y emulsión bacilar. El sistema más utilizado en la actualidad.

Tubos de 2 gramos de pomada de tuberculina Pantígena Wolff-Eisner, preparada bajo la dirección y control de este gran fisiólogo. Tubos, Nnos. I, II, III, cada uno en concentración doble al anterior. USO: Una fricción de 1½ a 2 centímetros de cinta de pomada en brazo, muslo o pecho, cada 4-8 días, durante períodos de varios meses

Instituto Latino de Terapéutica (antes Laboratorios Celsus)

Calles Laboratorios Celsus y Planella — BARCELONA — Apartado 865

Por inspección se ve en sus genitales externos como una tumoración prominente de aproximadamente doble que una naranja. Apreciado detenidamente, solo *de visu*, se sospecha que se trata sencillamente de un prolapso de pared vaginal posterior, cosa que se comprueba por tacto vaginal y rectal y por la continuidad que se nota en la presunta tumoración del tejido suyo mucoso con el de piel de genitales externos en su parte inferior.

Convencidos de este prolapso procuramos reducirlo hacia adentro con la mano izquierda, cosa que se consigue fácilmente en los intervalos del dolor, mientras que con dos dedos de la mano derecha hicimos un tacto tocológico que nos demostró una presentación de nalgas y que con gran facilidad pudimos desdoblarse el feto y hacer una extracción de pies y la consiguiente salida total del feto con maniobra de Mouriceau, cosa que fué facilísima por tratarse de feto muerto muy pequeño y en pocos minutos, en resumen se solucionó a completa satisfacción aquello que había parecido una cosa digna de preocupar.

No queremos sacar otra consecuencia que el convencimiento de lo expresado en el epígrafe que hemos puesto a esta ligera nota clínica.

Lo que uno ve y lo que dicen los libros

Siempre que veo (como vemos todos los médicos) hechos clínicos en contraposición con lo adquirido por teoría en los libros y casi consagrado por los autores, me acuerdo de aquellos concienzudos experimentos en animales de Laboratorio hechos por Ribera en el Hospital del Niño Jesús, que sirvieron para demostrar experimentalmente la absoluta equivocación en que estuvieron durante una veintena o treintena de años los autores (que se copiaban unos a otros) sobre la génesis de las tuberculosis óseas y articulares tal como las había explicado la escuela francesa, sin que a nadie se le hubiera ocurrido repetir y comprobar los experimentos en que se apoyaba.

El pequeño hecho que voy a referir (que ya lo hago por encontrarme con la pluma en la mano tratando de estos asuntos), se refiere a que los autores de obstetricia dicen que las posiciones occipito-posteriores de la presentación de vértice, es regla general que se trate de fetos pequeños y de mujeres de periné poco resistente y multíparas. Y he aquí que estos días hemos tenido una aplicación de forceps en una occipito-posterior y extrajimos un feto hembra, muerto (por madre sífilítica con lesiones y alteraciones generalizadas) que pesaba 3.200 gramos. Era más que normal de peso, como se ve.

Y respecto a resistencia de periné se trataba de una primípara y su resistencia estaba demostrada en el hecho de que con una regular laboriosidad en la aplicación de forceps (justo es decir que algunas occipito-anteriores nos han costado más trabajo) no hubo ningún desgarro perineal.

Vaselatum,

Específico de la atonía intestinal.

Depósito: Laboratorio «Xiela». Prado, 15, Madrid.

Como al mismo tiempo se ha dicho por los autores que esas dos condiciones (pequeñez de feto, falta de resistencia de periné) eran las dos causas de las posiciones occipito-posteriores, he aquí que por esta vez parece que hay que buscar otra explicación.

SECCIÓN PROFESIONAL

DIRECTOR: DR. M. RUIZ MAYA

EL MOMENTO PROFESIONAL

El Reglamento de Sanidad Municipal

Por los extractos publicados en la prensa diaria, sabrán nuestros lectores que en la «Gaceta» del día 17 apareció el Reglamento de Sanidad Municipal y al par la prohibición de publicarlo los particulares durante cuatro meses, suelto o en colección.

En este Reglamento aparece creado el Cuerpo de Inspectores Municipales, que serán todos los titulares actuales y cuantos sean nombrados hasta la convocatoria de las primeras oposiciones; habrá tantos Inspectores cuantos titulares en cada Ayuntamiento; tendrán de emolumentos el diez por ciento del sueldo de titular; las vacantes se cubrirán por concurso entre los que formen el Cuerpo; en las cabezas de partido y en las capitales, serán Inspectores los Subdelegados, sin derecho a retribución; tendrán una oficina en las Casas Ayuntamiento, con material y personal auxiliar.

Regúlase la Asociación Nacional de Titulares, y en tanto ésta se constituye, creáanse en los Colegios la Sección de titulares que entenderá en cuantos asuntos a éstos competan.

Con el nuevo Reglamento los titulares no serán nombrados por los Municipios, una vez constituido el Cuerpo; se ingresará por oposición, con programa único formado por el Real Consejo de Sanidad, celebrándose las oposiciones anualmente en Noviembre, en el Distrito Universitario; una vez establecida la Escuela Nacional de Sanidad, los nuevos Inspectores habrán de practicar en ella durante dos meses.

Dependerán directamente del Alcalde y del Inspector provincial. Serán jefes de la oficina de Sanidad del Ayuntamiento y secretario neto de la Junta Municipal de Sanidad. No podrán ser separados de sus cargos sin previo expediente, con audiencia del interesado y previo informe de la Junta Municipal en pleno. No se aprobarán los Reglamentos de los funcionarios técnicos municipales sin oír a los facultativos adscritos a los servicios benéficos y sanitarios.

Las titulares no podrán exceder de 300 familias pobres; pudiendo dividirse éstas si la extensión o topografía del término municipal lo aconsejaren. En cada partido médico habrá una matrona retribuida y un practicante titulado, que será además auxiliar del Inspector.

Especificanse los deberes del cargo; háblase de la constitución de las Juntas de Sanidad; y de cuanto se refiera a la vida sanitaria municipal.

CONVERSANDO CON LA CARICATURA DEL DOCTOR RONCAL

—¿Contestará de buen grado?—Sí, contesto de buen grado.

—¿Se cree hombre de talento?—Distingo; según del talento de que se trate: si del inteligente, el de comprensión de los hechos científicos, sin duda poseo alguno; ahora, de inquirir y preguntarme por el otro talento, el de saber vivir y saber crecer y saber fingir, de ese talento no poseo ni un ápice.

—¿Qué títulos y honores posee?—Tengo bastantes, que representan indudablemente méritos de a ochavo, pero concretos, y hechos, a medida los más, no me envanecen, antes al contrario me hacen reír.. ¡Para lo que me sirven!

—¿Ha publicado algo?—Mucho; casi todo anodino, bastante original, algo que previamente se había madurado en el laboratorio durante años enteros, y que han leído siete u ocho amigos, a lo sumo.

—¿Ha inventado algo en Medicina?—Nada de importancia.

—¿Por qué se hizo oto-rino-laringólogo?—Por las dificultades del oficio.

—¿Debiera prohibirse el uso del tabaco?—Nunca.

—¿Por qué fuma puro en pipa y no tabaco picado?—Porque el tabaco picado, en la pipa se le apaga al esquirol de fumar en pipa (digámosle así) quinientas veces; al virtuoso profesional, no; yo no llegué a tal perfección, e inventé el relleno de la cachimba con segmentos de puro, con resultados brillantísimos. Puedo decir orgulloso que he formado discípulos.

—¿Le alegra por su especialidad la difusión de la radiotelefonía?—No, en mis días; más inalámbrico es el gramófono, para el que tengo la primacía de mis ascos.

—¿Cómo se hizo escultor?—La necesidad de ganar dinero. Realmente no aspiré más que a vaciar bien.

—¿Le produce mucho la escultura?—Me han pagado casi fabulosamente algunas cositas; entiéndase fabulosamente para mí, que he sido siempre hombre de poco dinero.

—¿Tiene alguna característica personal su arte escultórico?—No puedo yo apreciar ese extremo.

—¿Se considera gran artista?—De ninguna manera; forzosamente ha de faltarme técnica, que para este arte escultórico es fundamental.

—¿Hay un médico en nuestra ciudad más desaliñado en el vestir que usted?—¡Pero si yo creía firmemente en mi elegancia!

—¿Es usted así por artista o por médico o por qué?—Repito que me creía espontáneamente elegante; porque eso sí, de no ser espontáneamente no podía resultar de otra manera.

—¿Qué muerte desea?—Sin violencias; a buenas, por decirlo así; en una palabra, cuando le quede a uno un poco que morir, como les sucede a los muy viejos, que se mueren sin darle la menor importancia.

—¿Qué enfermedad le desearía a su mayor enemigo?—No les deseo a mis



Pectobenzol Insustituible en catarrros y toda clase de afecciones del pecho.
Depósito: Laboratorio «Xiela», Prado, 15, Madrid.

enemigos ningún mal, *por tablas*; aplastarlos directamente sí, pero nada más.

—¿Para qué sirven los rayos X?—Los rayos X son como todas las cosas, según las manos que los manejan y la categoría de la instalación que se posea.

—¿Cree usted en la tuberculosis?—¡Ya lo creo!

—¿Daría usted un beso de cine a una bella mujer con ocena?—Así en frío, ¡horror!; sin embargo, cuando las ganas de... aprietan, ni las sagradas tumbas, etc., etc. (palabras del poeta).

—¿Quiere decirnos un camelo médico?—Camelo moderno total... la Radiumterapia. Camelo medio, el setenta por 100 de las aguas minero-medicinales. Creo quedará usted complacido.

—¿Cree V. en algún medicamento?—En bastantes, antiguos y modernos.

—¿Qué condiciones exige usted para calificar de notable a un médico?—Para mí es notable todo aquel que siente su carrera, y la Medicina más que ninguna, como arte; y siendo arte y siendo artista, ha de aspirar constantemente a ser original, a crear, y para crear es necesario conocer lo anteriormente creado; esto no puede conseguirse más que estudiando, y como estudiando se conocen de cosas geniales que comprende uno no puede superar, las acepta y pone en práctica, desechando en cambio tanto malo como se ha visto obligado a conocer.

—¿Hay algún notable aquí?—Sí señor; hay aquí poco más de media docena de médicos notables y *aun sobresalientes*, entre viejos y jóvenes, de los que pinchan y cortan y de los que ni pinchan ni cortan, en toda la extensión de la intención.

—¿Porqué andamos los médicos a la greña continuamente?—Qué sé yo; sin embargo, es posible que se trate de rebeldías naturales contra lo que es quimera y desatino intentar revelarse: la suerte, la pícara suerte, porque hay cada adocenado, por esas clientelas de Dios, triunfando sobre los inteligentes; y es más, muchos de aquellos indoctos vulgarotes, están dotados de una verdadera fuerza medicatriz o *curandetriz*, que no debe poderse adquirir ni en los libros, ni en el esfuerzo por hallar la perfección.

—¿Cómo acabaría esto?—Resignándonos todos a los caprichos del destino y comprendiendo que, en esencia, todo es suerte o desgracia, y que el que nace para cuarto.. se queda en cuarto.

—¿Cómo desearía ejercer la profesión?—Al alimón; a mí me encantaría tener a mi lado un compañero culto con quien pensar en voz alta ante todos los casos clínicos; *yo solo, me hago más de un lío*.

—¿Está satisfecho de su servicio en el Hospital?—Satisfechísimo.

—¿Hay algo en nuestra profesión que le haga reír?—Infinidad de cosas.

—¿A cuales llama sus mejores clientes?—A los que antes que sabio me creen bueno.

—¿Cuántas veces se pela usted al año?—¡Pero si yo encuentro placer en pelarme! Lo que sucede es que mi precioso pelo rizado, llevándolo corto, me produce un picor insoportable y hé de dejarlo crecer para que me deje en paz. Lo que me molesta de verdad es afeitarme..., eso sí.

—Cuénteme una anécdota personal.—Una de las más graciosas que me han sucedido fué la siguiente: Tenía a mi servicio clínico particular al excelente practicante Angelito Cuevas, el cual, por feliz coincidencia conmigo, fuma constantemente puros y viste, hasta la bata de trabajo, con más elegancia y limpieza que yo; sucedió, que llegó a la clínica, para ser reconocida, cierta mujer de pueblo, y al adelantarme yo, como era natural, para recibir a y comenzar el interrogatorio, observé que no me hacía gran caso, a la vez que el deseo de la enferma de dirigirse a Cuevas en su conversación; tercié yo al fin, y le dirigí cierta pregunta que no fué contestada; repetí mi interrogatorio, y entonces la mujer, harta sin duda de mi impertinencia, me replicó violenta: «Me quiere usted dejar hablar con el médico que es el único que me ha de preguntar y ver...» El médico no podía ser otro, según ella, que Angelito, realmente afeitado, tan serio y con su bata magnífica; tenía que ser yo, no digo el practicante, el asistente!

Por el interrogatorio,

DR. R. M.

Pectobenzol, *Insustituible en catarros y toda clase de afecciones del pecho.*
Depósito: Laboratorio «Xiela», Prado, 15, Madrid.

ESPECIALIDADES, FARMACÉUTICAS DEL
LABORATORIO F. MIRABENT Y CIA S. C. BARCELONA (G.)

MORRHUÉTINE JUNGKEN

El tónico de la Infancia.

*Substituye ventajosamente al aceite de hígado de bacalao.
Sabor gratisimo — Digestión perfecta.*

Yodo - Hipofosfitos comp² - Fosfato sódico - Glicerina químicamente pura

NURRISOL

Jarabe Galactógeno

*Estimulante de las glándulas mamarias. Reconstituyente
general para las mujeres que crían.*

Galega - Semillas de Algodón - Glicerofosfatos - Tintura de Vanilla - Canela - Nuez moscada

PAHIRVOL

*Tónico Estomacal — Tratamiento eficaz de la insuficiencia
gástrica.*

Pepsina - Acido Clorh. - Tint. badiana, nuez vómica y coqa.

FOSFOXYL

*Fósforo coloidal asimilable — No tóxico
Es el específico de toda debilidad
moral o física.*

UROLAN

*Tratamiento de la Diatesis Úrica y de las Auto-
intoxicaciones.*

Granulado de Piperacina - Benzoato de Litina y Urotropina

MUESTRAS GRATUITAS A LOS SRES. MÉDICOS Y A LAS CLÍNICAS Y HOSPITALES



INSTITUTO FERRAN

DE PATOLOGÍA EXPERIMENTAL Y DE HIGIENE

VACUNA Y SUERO ANTI-ALFA

Para la vacunación de los niños contra la tuberculosis, y para el tratamiento de las enfermedades pretuberculosas, la tuberculosis incipiente y las enfermedades rebeldes a los métodos de curación clásicos, como la diabetes, las hipercloridias, afecciones ováricas, gota militar, púrpuras y otras enfermedades de la sangre y de los vasos.

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

Pídanse muestras y literatura al

INSTITUTO FERRAN

APARTADO NÚM. 250

BARCELONA

ESPECIALIDADES del Dr. AMARGÓS

Farmacéutico laureado con el premio extraordinario de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona

Premiado en las Exposiciones Universales de Paris (1900), Barcelona (1838) y Buenos Aires (1910)

La pureza de sus componentes, su exacta dosificación y su forma de preparación aseguran su virtud terapéutica

Elíxir Clorhidro-Pépsico Amargós Tónico digestivo de pepsina, colombo, nuez vómica y ácido clorhídrico.

Elíxir Polibromurado Amargós Los bromuro estróncico, potásico, sódico y amónico, químicamente puros, asociados con sustancias tónico-amargas.

Vino Amargós Tónico nutritivo, preparado con peptonaquina gris, coca del Perú y vino de Málaga.

Vino Vital Amargós *al extracto de acatnhea viridis compuesto.* Es un excitante poderoso de las energías cerebro medulares y gastro-intestinales y un excelente afrodisíaco.

Vino Iodo-Tánico Fosfatado Amargós Fortalece, robustece y purifica, sustituyendo con ventaja al aceite de hígado de bacalao y sus emulsiones.

Nuclerrhenal Amargós a base de glicerofosfato-nucleido y vanadato sódicos, acatnhea viridis y arrhenal.

Elíxir Hidrastis y Viburnum Amargós

Menarquión Amargós a base de cerium, salicilicum para combatir la dismorrea.

Pastillas Amargós de borato sódico, clorato potásico, cocaína y mentol.

Laxol Amargós a base de cáscara sagrada.

Suero Amargós Tónico reconstituyente inyectable. Cada ampolla de un c. c. contiene cacodilato de estriquina, 1 mgrm; cacodilato de sosa, 5 centgrs.; glicero-fosfato de sosa, 10 centgrs.; suero fisiológico.

Suero Amargós FERRUGINOSO, TONICO RECONSTITUYENTE. Cada ampolla de 1 c. c. contiene: cacodilato de estriquina, 1 mgrm; cacodilato de sosa 5 centigramos; cacodilato de hierro, 3 centgrs., y glicero fosfato de sosa, 10 centgrs.

DEPÓSITO GENERAL:

Farmacia Dr. Amargós.-Cortés, 650, chaflán a la de Claris

BARCELONA

Además se expenden en las principales Farmacias, Droguerías y Centros de especialidades farmacéuticas de todas las poblaciones importantes del mundo

Farmacia y Droguería del Centro
Angel Avilés Marín

Sucesor de la UNIÓN FARMACÉUTICA CORDOBESA

Claudio Marcelo, núm. 8

Teléfono núm. 165

CÓRDOBA



Instituto Provincial de Higiene

Director Dr. Miguel Benzo Cano

COMISIÓN PERMANENTE

INSPECTOR PROVINCIAL DE SANIDAD

de la

JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD

Alfonso XIII, 18 (Gobierno civil)

CÓRDOBA

Teléfono núm. 95.—Horas de despacho, de 10 a 1

Reconocimiento de alimentos y bebidas.—Análisis químico y bacteriológico de las aguas.—Análisis de minerales, leche, sangre, jugo gástrico, orina, esputos, pus, excrementos, tumores y de otros productos.—Serodiagnóstico de la fiebre tifoidea, paratífus, fiebre de Malta, sífilis (Reacción de Wassermann), etc.—Tratamientos antirrábicos.—Sección de sueros y vacunas.—Sección de Higiene Pecuaria.

Parque Sanitario de desinfección. — Brigada sanitaria móvil

CAMPO SANTO DE LOS MARTIRES, SIN NUM.

TELÉFONO NÚMERO 371

Servicio de desinfección de viviendas, ropas, etc.

DROGUERÍA Y ORTOPEDIA

**EXTENSO SURTIDO DE INSTRUMENTOS DE
CIRUGÍA Y MATERIAL DE FOTOGRAFÍA**

RAFAEL OTERO DÍAZ

SUCESOR DE JOSÉ POLO

JOAQUIN COSTA, N.º 12
(Frente a la Casa de Socorro)

CORDOBA

HORMO-FERRIL

"HELIOS"

TÓNICO FEMENINO



FÓRMULA

Glicerofosfato de cal . . .	15 ctgms.
Hipofosfito de sosa . . .	10 id.
Metilarsinato sódico . . .	3 id.
Protoyoduro de hierro . . .	5 id.
Vanadato sódico . . .	1 mlgm.
Tintura de Nuez vómica . . .	3 gotas.
Hormonas ováricas . . .	10 id.
Elixir	C/S para 15 c.c.

DOSIS: Una cucharada de sopa antes del almuerzo y otra cucharada antes de la comida; para niñas, cucharada pequeña.

HORMO-FOSFIL

"HELIOS"

TÓNICO MASCULINO



FÓRMULA

Glicerofosfato de cal . . .	15 ctgms.
Hipofosfito de sosa . . .	10 id.
Metilarsinato de sosa . . .	3 id.
Vanadato sódico . . .	1 mlgm.
Tintura de Nuez vómica . . .	3 gotas.
Hormonas testiculares . . .	10 id.
Elixir	C/S para 15 c.c.

DOSIS: Una cucharada sopera antes de cada comida.

Farmacia y Laboratorio

PRADO LARA

NUTRITIL "HELIOS"

Extracto Concentradísimo de Gramíneas y Leguminosas

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Este preparado se emplea como único alimento a la dosis de una cucharada sopera cada dos horas mezclado con agua natural, agua de seltz, café o te.

Para los niños una cucharadita de café o postre, según la edad, y con los mismos líquidos antedichos.

Farmacia y Laboratorio **PRADO LARA**

Inspección Provincial de Sanidad

Asuntos tramitados por esta Inspección provincial, de interés personal para las clases sanitarias:

—Al Delegado Gubernativo de La Rambla, Alcalde y Subdelegado de Medicina, se les da cuenta del nombramiento del Subdelegado de Medicina sustituto de dicho partido judicial a favor de don José Hidalgo e Hidalgo.

—Al Delegado Gubernativo de Lucena, Alcalde y Subdelegado de Veterinaria sustituto de dicho partido judicial a favor de don Luis Manjón Cabeza y García.

—Al Alcalde de Santa Eufemia se le indica que para autorizar la publicación del edicto de la plaza de médico titular, precisa que se atenga a la circular número 4 811 del «Boletín Oficial» de 9 de Septiembre último.

—Al «Boletín Oficial» de la provincia se remite edicto anunciando una plaza de practicante titular en Espejo.

—Se interesa de la Alcaldía de Villaharta abone sus atrasos al médico titular.

—Al Alcalde de Villaharta se traslada oficio del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia sobre débitos al Inspector de Carnes señor Galán Rayo.

—Al señor Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia se le traslada comunicacion de la Alcaldía de Palenciana, así como el importe de las cuotas que adeudaba a dicho Colegio el Profesor Veterinario a dicho Municipio don Ramón Sánchez Arjona.

—A los Alcaldes de Montalbán y Fuente Palmera se les participa la resolución del asunto de las reclamaciones sobre las nuevas tarifas médicas establecidas por los médicos de los citados pueblos.

—A los Delegados Gubernativos de los partidos judiciales se les remite circular encareciéndoles que para 1.º de Marzo próximo se hayan confeccionado las listas de pobres en los pueblos de sus distritos que no las hubieren hecho con anterioridad.

—Al Alcalde de Santa Eufemia se le comunica rectifique edicto enviado anunciando una vacante de Médico titular por corresponderle de 3.ª categoría en vez de la 4.ª que se consigna en mencionado edicto.

BULGALÁCTIDO

Cultivo de bacilos Búlgaro, Láctido y Bífido

DOSIS: Adultos: 1 o 2 cucharadas de sopa en cada comida, pura o mezclada con agua azucarada. Niños: cucharaditas de café.

INSTITUTO MÁRQUEZ. - MÁLAGA

—Al «Boletín Oficial» de la provincia se remite edicto de la Alcaldía de Valenzuela anunciando una plaza de Farmacéutico titular.

—Al Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia se le remite traslado de la información hecha por el Alcalde de Villaharta sobre las reclamaciones de los farmacéuticos de Espiel señores Pineda y Crespo.

—A la Alcaldía de Adamuz se envía para su informe instancia del médico titular señor Avila Luque.

—Al «Boletín Oficial» de la provincia se envían edictos anunciando plaza de Veterinario titular en Valenzuela, Matrona de la Carlota y Médico titular de Santa Eufemia.

—Al Inspector Municipal de Sanidad de Fernán Núñez se le impone la multa de 25 pesetas por no remitir la estadística de morbilidad al Subdelegado del distrito.

NUEVOS LIBROS

Terapéutica Obstétrica, por el Dr. Cirilo Jaunin, 2.^a edición. Tomo XXVI de la Biblioteca de Terapéutica Gilbert y Carnot. Un volumen de 470 páginas con 173 figuras en el texto. Salvat, editores. Barcelona

Fitoterapia. Medicamentos vegetales, por los Drs. Adrian Pí y S. Bounamour. Tomo IX, de la Biblioteca de Terapéutica Gilbert y Carnot. Un volumen de 624 páginas con 200 figuras en el texto. Salvat, editores. Barcelona. Oportunamente nos ocuparemos de ellos.

Manual de Bacteriología, por Ch. Dopter y H. Sacquepée, profesores de Val-de-Grace. Segunda edición revisada y aumentada. Aparece el segundo tomo con 169 figuras en negro y colores.

Enfermedades tropicales, publicado por Eelipe H. Manson-Barh. Traducción española de la séptima edición inglesa. Un tomo ilustrado con 21 láminas en colores, 6 en negro, 404 figuras en el texto y 31 gráficas.

Tratado práctico de los métodos de exploración clínica, por el profesor Dr. H. Sahli, de la Universidad de Berna. Tercera edición española, traducida directamente por el doctor León

SOLUTO

Reconstituyente general
del organismo

Elixir e
Inyectable


VITAL

Laboratorio
ARRANS
SEVILLA

Cardenal, de la sexta alemana. Dos tomos, con 632 y 620 páginas, respectivamente, ilustrados con 350 grabados y 8 láminas en colores.—Editados por P. Salvat, Mallorca, 41-39, Barcelona. Sucesivamente nos iremos ocupando detenidamente de estas interesantes publicaciones.

Manual de Terapéutica proteínica, por el Dr. Zschiesche. 1924. Un volumen de 172 páginas. Editado por Librería Médica Roig. Barcelona.

TALLA EN MADERA,
OBRA DEL GRAN ESCULTOR DR. RONCAL



VARIOS

Academia de Ciencias Médicas

En la sesión del pasado día 5, fueron presentados por el académico don Rafael Castejón, cincuenta clichés, adquiridos de la Universidad de Lieja, procedentes de un interesante manuscrito del siglo xv, que es copia de un original del siglo xi, debido al célebre médico cordobés Albucasis; forman parte de un notable tratado de dietética de este autor. Los clichés serán publicados en un folleto por la Academia, como homenaje al célebre enciclopedista cordobés.

Papel de fumar Imperial, usan todos los médicos.

—En el próximo mes de Marzo, se celebrarán sesiones los días 5 y 26.

—En el próximo continuaremos los extractos de las sesiones de la Academia.

Erratas importantes

En el primer artículo de este número debe decir: Manuel Villegas Laguna, y no Vilegas Montesinos.

En la portada dice: 30 de Febrero.

Óbitos

Han fallecido: en Montoro, el padre de don Antonio Ager Notario; en Pozoblanco, un hermano del médico odontólogo don Manuel Caballero, y en Córdoba, la abuela del médico de la Casa de Socorro, don Antonio Ortiz Clot.

A tan distinguidos compañeros y respectivas familias, enviamos cordialmente la expresión de nuestro profundo pesar.

Nuevo director

Ha sido nombrado director de la notabilísima Revista «Archivos de Medicina, Cirujía y Especialidades», de Madrid, el ilustre psiquiatra doctor Sanchiz Banús.

Le felicitamos y al par a la Revista hermana, a la que esperamos grandes y rotundos éxitos bajo la dirección de tan preclaro cerebro.

Gabinete de Masoterapia

Nuestro buen amigo, el culto practicante don Zoilo González Cabello, nos ofrece su gabinete de masoterapia, en la Plaza de San Bartolomé, sin número.

Agradecemos la delicada atención y le deseamos éxito en su ejercicio.

Encartes

Con este número recibirán los lectores:

—Un secante con la utilísima fórmula del «Yodarsolo» del Laboratorio Baldacci. Pisa

—Las fórmulas del «Cerebrino» y «Tónico» Mandrí.


—Las fórmulas de la «Cerealine» y «Neumocol» del Laboratorio Salus, de Zaragoza.

JARABE ARRANS

De amapolas Fosfo-Creosotado

Medicamento Específico
de las enfermedades del
PECHO y VÍAS
RESPIRATORIAS

LABORATORIO ARRANS
SEVILLA



Para levantar rápidamente las fuerzas de los convalecientes de toda enfermedad, para anémicos, débiles, neurasténicos y siempre que se considere útil un reconstituyente, recetad

TÓNICO MANDRÍ

Feliz asociación de los elementos reconocidos como tónicos por la práctica y la experiencia, con los fermentos digestivos puros y seleccionados, más un medicamento de tanta eficacia para excitar la secreción de los fermentos naturales como es el condurango. Fórmula por cucharada grande o dosis: Glicerofosfato de cal, 15 centígr.; Fosfato sódico, 10 centígr.; Arrhenal, 3 centígr.; Exts. flúidos de nuez de kola y de condurango, aa 40 centígr., y fermentos digestivos, 80 centígr. Todo asociado a plantas aromáticas que dan un conjunto agradable al paladar y al estómago más delicado.

Este producto se elabora por el **Dr. Francisco Mandri**, médico y químico-farmacéutico, en su laboratorio, Escudillers, 6.—BARCELONA.

IMPRESA MODERNA-GORDOBA

Para levantar rápidamente las fuerzas de los convalecientes de toda enfermedad, para anémicos, débiles, neurasténicos y siempre que se considere útil un reconstructor, recetad.

TÓNICO MANDRI



Felix asociación de los elementos reconocidos como tónicos por la práctica y la experiencia, con los fermentos digestivos puros y seleccionados, más un medicamento de tanta eficacia para excitar la secreción de los fermentos naturales, como es el condurango. Fórmula por cucharada grande o dosis: Glicerofosfato de cal, 15 centigr.; Fosfato sódico, 10 centigr.; Arriñal, 3 centigr.; Elix. fluidos de nuez de kola y de condurango, 40 centigr.; y fermentos digestivos, 80 centigr. Todo asociado a plantas aromáticas que dan un conjunto agradable al paladar y al estómago más delicado.

Este producto se elabora por el Dr. Francisco Mandri, médico y químico-farmacéutico, en su laboratorio, Escudillers, 6.—BARCELONA.

IMPRESA MODERNA BARCELONA

ESPECIALIDADES RECOMENDADAS

Sarnicida Moisés, líquido de cómoda aplicación.

Febrida, infalible antipalúdico de forma americana.

Jaquanida, analgésico inofensivo en caja metálica de un sello

Bálsamo Analgésico Moisés, f. B.

Valerobromado Moisés, anticonvulsivo histero-epiléptico

Febrida Infantil, de fácil administración y máxima eficacia.

Elixir Clorhidropéptico Moisés, f. G.

Cápsulas Moisés Antipalúdicas Ferruginosas.

Gotas Odontálgicas, calmante rápido del dolor de muelas.

Distinguen a estas especialidades su eficacia permanente, su precio económico y su presentación irreprochable.

LABORATORIO FARMACÉUTICO **MOISÉS MORENO**
POZOBLANCO (CORDOBA)

Langherina Fher



Tabletas de 3 unidades clínicas de la secreción interna del páncreas. Insustituible en el tratamiento de las afecciones pancreáticas, insuficiencia digestiva y Diabetes Mellitus

Pídase literatura especial de este preparado

ELIXIR GOMENO-GUAYACOL F. LESTON

Registrado en la Inspección General de Sanidad n.º 2891

COMPOSICIÓN EN 20 GRAMOS:

Gomenol.....	0,12
Guayacolsulfonato potásico.....	0,30
Benzoato cálcico.....	0,28
Dionina.....	0,0032
Clorhidrato de codeína.....	0,0048
Cafeína.....	0,012
Tint. corteza de naranjas dulces..	1,50
Excipiente azucarado.....	c. c.

Preparado por A. FUENTES LESTON, Farmacéutico

CÓRDOBA

En las **Bronquitis** crónicas
Gripe
Tuberculosis

CONSTIPADOS DESCUIDADOS. TOSAS REBELDES. ASMA
 Una cucharada de las de sopa, por la mañana, á medio día, y por la noche de

JARABE FAMEL

Calma rápidamente la Tos, facilita la Expectoración, obra favorablemente sobre el estado general.

Muestras á disposición de los Sres. Médicos
 AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA: CURIEL Y MORAN Aragón 228. Barcelona

*tratamiento integral
 de todas las afecciones del sistema venoso*

PROVEINASE MIDY

Varices
 Varicosidades
 Varicoceles
 Ulceras varicosas
 Edemas postflebiticos
 Almorranas

Asociación de extractos de plantas
 cuida dosamente, elegidas
 Castaño de India - Cupressus - Viburnum - Hamamelis
 y de extractos de glandulares á secreción interna
 Hipofisis - Suprarrenal - Tiroide
 2 ó 6 COMPRIMIDOS AL DÍA
 (Tragar sin mascar)

Trastornos congestivos
 de la menopausis
 y de la pubertad
 Hipofixia
 Criestesia
 Astenia

POMADA MIDY

MEDICACION LOCAL
 DE LAS ALMORRANAS
 LABORATORIOS MIDY
 4 Rue du Colonel-Moll - PARIS

SUPOSITARIOS MIDY

Tratamiento rápido, eficaz e inofensivo de la

SIFILIS

Por las inyecciones intramusculares indoloras de

BISMUXEL

IODO-BISMUTATO DE QUININA

El Bismuxel, además de emplearse como medicina única en la avariosis, puede alternarse con los arsenicales en sustitución del mercurio, a los que suple con muchísima ventaja.

VITASUM

SIMPLE-INYECTABLE-FERRUGINOSO

Indicado siempre que un organismo debilitado necesite un activo reconstituyente.

BRONQUIMAR

(INYECTABLE)

Indicado en todos los casos en que convenga disminuir las secreciones bronquiales y hacer una antiseptia rápida y enérgica del árbol aéreo.

MUESTRAS Y LITERATURA A DISPOSICIÓN DE LA CLASE MÉDICA

Laboratorio del Dr. Fernández de la Cruz

CARNE, 11.-SEVILLA

HEMO-CALCIN



CALCIO ASIMILABLE

ACTIVA LA FOGACITOSIS.

ESTIMULA LOS PROCESOS DE ASIMILACIÓN CELULAR.

PARALIZA LA FORMACIÓN DE EXUDADOS.

LABORATORIOS VIÑAS - BARCELONA

PHOSPHORRENAL
 RECONSTITUYENTE
 GRANULAR
 ELIXIR
 INYECTABLE
ROBERT

PEPTOYODAL
 YODO
 ORGÁNICO EN
 LIQUIDO É INYECTABLE
ROBERT

NATROCITRAL ANTIDISPÉPTICO
 COMPRIMIDO
 Y GRANULADO
ROBERT

GRAGEAS ROBERT
 PARA LA **TOS** (EN GRAGEAS)

LAURIA 74 • EL LABORATORIO

ROBERT
 BARCELONA

VALENCIA 314

R. ALEMANY