

## DESCRIPCIÓN DE UN NUEVO REDUVIDAE DE LA ARGENTINA

POR EL DOCTOR A. DA COSTA LIMA

**Rocconota Bruchi** n. sp.

*Macho*. — Cabeza, vista de arriba, con la región post-ocular presentando los lados, hasta el cuello, casi paralelos, poco convergiendo hacia atrás; vista de lado, con las yugulares prolongándose en tubérculo cónico cuyo ápice no excede al perfil del *tylus* con la gula recta hasta la región del cuello y con la línea imaginaria tirada del surco transversal ante-ocular al ápice del 1<sup>er</sup> segmento del rostro, tocando tangencialmente el borde posterior del ojo. Al nivel de los ocelos la cabeza es más elevada que en la parte inter-ocular, pero presenta declive en curva acentuada hasta el cuello (pescuezo).

Antenas un poco más largas que el cuerpo; 1<sup>er</sup> segmento (6 mm) con el ápice excediendo la punta del escutelo; 2<sup>o</sup> (2,75 mm) un poco más largo que el 4<sup>o</sup>; éste 2 mm más corto que la mitad del 3<sup>o</sup> (aproximadamente 5 mm). Detrás de cada antena hay un tubérculo casi invisible, menos saliente que el ocelo.

Rostro con el 1<sup>er</sup> segmento más largo que el 2<sup>o</sup> y casi tan largo como el 2<sup>o</sup> y 3<sup>o</sup> reunidos.

Lóbulo anterior del pronoto presentando cerca de la constricción interlobular y de cada lado del profundo surco medio-longitudinal, un pequeño tubérculo casi invisible.

Lóbulo posterior aparentemente inerte; todavía, examinado con fuerte aumento, presenta en los puntos en los cuales se insertan las 4 espinas posteriores en otras especies, pequeñas salientes. En un ejemplar, que figura en poder de Bruch y del cual recibí una fotografía, tales salientes deben ser más evidentes.

Tibias anteriores encorvadas y dilatadas en el ápice, como en

las demás especies del género. Tarsos pequeños, pero no tanto como en *Debilis*, más largos que el ancho de la tibia en el ápice.

Abdomen con denticulo en los ángulos apicales del 1<sup>er</sup> uromero, los demás uromeros inermes.

Color general flavo-testáceo : de color bermejizo : una línea mediana en la cabeza, de entre los ocelos hasta el cuello, los dos tubérculos pronotales, algunas estrías indistintas femurales y una faja ventral mal delineada, debajo del conectivo.

Sobre el pronoto, hemiélitros y pleuras se ven distintamente pequeñas máculas esparcidas de tomento crema, como en las especies de *Heza*.

En el ejemplar que examiné no se ve anilladura alguna en los miembros, de los cuales carece también el fototipo.

Largo hasta el ápice del abdomen : 14 mm ; hasta el ápice de los hemiélitros : 15 mm.

Criados en la Argentina por el doctor C. Bruch, a quien dedico esta especie.

Holotipo, en Instituto Oswaldo Cruz, n° 4534 (frasco 1541), fototipo incorporado a las colecciones entomológicas del Museo de La Plata. Ambos ejemplares criados en Vicente López de un desove recogido por el señor Alberto Prosen en el Tigre (F. C. C. A.) el 12-I-1941 — 3-VIII-1941.

Esta especie es extremadamente próxima de *R. subannulata* (Stål, 1860) y de *R. simulans* Stål, 1860, ambas de Río de Janeiro, que sólo conozco por las descripciones originales.

En *R. subannulata*, ambos lóbulos del pronoto son inermes y sólo hay denticulos abdominales en el 1<sup>er</sup> uromero.

*R. simulans* presenta pequeños tubérculos en el lóbulo anterior del pronoto, denticulo obtuso en los ángulos laterales del lóbulo posterior, espinas distintas en los ángulos apicales del 1<sup>er</sup> uromero y pequeño diente obtuso en los ángulos de los 2° y 3° uromeros.

Las observaciones biológicas de Bruch, sobre este hemíptero, aparecerán en estas mismas *Notas*.

Río de Janeiro, octubre de 1941.