Castilla AGRICOLA

Núm. 174 Suplemento de "LIBERTAD" 18 de junio de 1960

EL CLIMA PRIMER *Factor*

Generalización de la siega en España

El campo se halla bien presentado

A trancas y barrancas la recolección sigue adelante, estimulados, o mejor dicho fustigados estos trabajos por la ininterrumpida sucesión de tormentas que, un día aquí y otro allá, descargan a diario sobre la Península. Menos mal que en las últimas ocho fechas han sido, por lo general, de tono menor, es decir, sin trombas de agua ni granizadas, la lluvia ha tenido en ese período características de mansedumbre, y mientras sea así, si es que estamos condenados a no ver más el cielo despejado, no está del todo mal, porque apenas si interrumpe las faenas en el campo y en la era, o cuando más, impone una breve tregua.

La siega se ha extendido ya por todo el territorio español, y particularmente en la mitad meridional, y de manera especial a Extremadura y Andalucía, junto con las tierras levantinas, se avanza mucho, pues es intenso el empleo de maquinaria, que sigue aumentando de año en año allí donde la extensión de las fincas permite utilizarlas.

Conforme tenemos dicho, la impresión es que el trigo será el de rendimientos más homogéneos, por ser el cereal más tardío y el que, por consiguiente, ha aprovechado mejor las lluvias de mediados de mayo. Jaén nos comunica que, en efecto, allí ha granado muy bien.

Alcázar de San Juan informa en sentido bastante tranquilizador. "Buen rendimiento en esta comarca manchega, pero nos superan por tierras toledanas de Villacañas, mientras que las mieses están más flojas en el sector conquense lindante con la provincia de Ciudad Real, donde está el campo tan verde, que es probable que no se eche la hoz hasta cerca de San Pedro. Añade que para la recogida de piensos—en la que participan mujeres en gran proporción— han escaseado brazos, sobre todo en las poblaciones industrializadas, como lo es la alcazareña. Para las mujeres han regido jornales de cincuenta pesetas, más la comida.

La mitad septentrional, dentro de la natural desigualdad en los sembrados, después de tantas y tan fuertes alternativas meteorológicas, van apreciándose cosas confortadoras. Es muy interesante el hecho de que impere la buena granazón, pero en la panorámica cerealista hay que tener muy en cuenta los parajes en los que no han podido prosperar las plantas, o se han quedado tan bajas que resulta imposible segarlas. Se ha optado, pues, por meter en esos predios el ganado. Menos mal, repetimos, que esos sensibles fallos tienen cierta compensación con el resto de la paramera. Medina del Campo, por ejemplo, nos dice: "El campo se halla bien presentado, esperándose que la cosecha sea bastante regular a pesar de lo que la sequía la ha perjudicado. Nuestra impresión es que la provincia menos afortunada va a ser la de Alava, tanto en grano como en cereales, hasta el punto de que la producción se calcula en un cincuenta por ciento de la del año pasado. La sequía allí ha sido tan terriblemente pertinaz, que incluso en estos momentos se deja sentir, lo mismo que en parte de la faja cantábrica, pues el campo santanderino adolece de falta de agua.

Ni que decir tiene que si las frecuentes tormentas causan en la cerealicultura pocos beneficios a estas alturas, las restantes riquezas del campo continúan beneficiándose con la condensación de las nubes mientras la precipitación no adquiera violencia. Así resulta que siguen afianzándose las buenas perspectivas para las plantas industriales y fruta en general; siquiera para los viñedos los aguaceros sean, por el momento, perniciosos en esta fase inicial de formación del fruto, y porque además las vaharadas de calor húmedo favorecen el desarrollo del mildeu. Especialmente en las zonas grandes productoras se sulfata con intensidad, como medida preventiva, pero este trabajo hay que alternarlo con la siega, y no se puede estar en todas partes al mismo tiempo.

ELISEO DE PABLO

MUCHACHO: ACUDE A LOS CAMPAMENTOS DE VERANO DE LA ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA

Informes e inscripciones, en Muro, 7.

Alarma en nuestras explotaciones porcinas

Una enfermedad nueva: La peste porcina africana

En el panorama de nuestras explotaciones pecuarias porcinas, harto menguadas en sus rendimientos económicos por la flojedad de precios de las reses y los relativamente altos precios de los piensos adecuados a la cría, recría y cebo de esta especie, ha surgido una circunstancia adversa, que mantiene preocupados a los ganaderos: una enfermedad hasta ahora desconocida en Europa contra la cual no conocemos aún medios profilácticos o curativos eficaces: la

"peste porcina africana". Queremos con estas líneas escritas al hilo de los acontecimientos epizootiológicos, llamar la atención de nuestros ganaderos de la provincia, ya que en nuestra Patria ha surgido recientemente un foco de esta temible enfermedad porcina en los alrededores de Badajoz, si tenemos en cuenta que de la región extremeña vienen a nuestra provincia con alguna frecuencia expediciones porcinas para ser vendidas en nuestras ferias y mercados. Y si bien la Dirección General de Ganadería, por medio de sus técnicos veterinarios especializados, ha movilizado todos los medios a su alcance para atajar esta epizootia, que de momento ha sido contenida merced a las severas medidas de sanidad pecuarias adoptadas para defender esa riqueza porcina, ese foco debe constituir una seria preocupación para todos los que poseen ganado porcino, sean tratantes o ganaderos, e incitarlos a adoptar medidas de preocupación para no ser sorprendidos y evitar se difunda a nuestra provincia.

Esta enfermedad apareció en el año 1957, en la vecina y fraternal República Portuguesa, traída al parecer por los restos de comidas procedentes de aviones de línea del servicio de Africa, y causó en aquella sazón más de 16.000 bajas en porcinos; las autoridades veterinarias portuguesas apuntaron, no obstante, un gran éxito al conseguir suprimir en poco tiempo el foco surgido. Pero este año apareció un nuevo foco de tan terrible epizootia, que se ha extendido a la provincia de Badajoz, creando la inquietud en nuestros recriadores de porcinos.

De los antecedentes de información que poseemos, la enfermedad es producida por un virus, enormemente agresor e infectivo, atacando cerdos de todas las edades. Sus síntomas son imprecisos para el ganadero, pues el único signo ostensible de alarma son unas manchas violáceas detrás de las orejas y en las entrepiernas y bajo vientre, además de la consiguiente fiebre, pérdida de apetito e intensa postración. Los veterinarios portugueses han observado también que los animales presentan los ojos casi invadidos por flujo o legañas de carácter purulento, que hace tengan los párpados pegados, con dificultad de visión.

En las autopsias se comprueban grandes hemorragias en casi todos los órganos, apartándose el cuadro de las lesiones típicas de la peste porcina europea, y americana. Por otra parte se han ensayado las vacunas y sueros curativos y preventivos corrientes, sin resultado apreciable. La mortalidad es del 100 por 100, por lo cual dejan vacías de ganado las pocilgas donde se presenta esta enfermedad.

Estamos por el momento indefensos ante esta epizootia, aunque ya los servicios técnicos de la Dirección General de Ganadería han conseguido identificar el virus y fijarlo, siendo de esperar se logre en plazo breve vacuna y suero eficaz, si el virus como esperamos, posee propiedades antihigiénicas suficientes para la elaboración de aquellos medios profilácticos.

Por ahora lo indicado es aplicar las medidas de prevención sanitaria más rigurosa, entre las cuales señalamos:

1.º No adquirir cerdos procedentes de Extremadura, ni reses que no sean de procedencia sana y conocida.

2.º Como parece ser que la puerta de entrada del virus es el aparato digestivo, no administrar alimentos a base de desperdicios, si no son previamente cocidos.

3.º Dar cuenta al veterinario de la existencia simultánea de varios animales enfermos, y aun siendo uno solo, si éste presenta manchas violáceas en los sitios corporales indicados.

4.º Tener rigurosamente aislado cualquier porcino que enferme, aun sin presentar dichas manchas, y que una sola y misma persona atienda el animal, con la precaución de que no visite las casas donde haya explotación porcina, ni asimismo ferias o mercados donde se contrate esta especie animal.

trarselo en forma de amasijo cocido. Caso de diagnosticarse la enfermedad, proceder al sacrificio inmediato de todos los porcinos de la explotación, sean enfermos o sanos, quemando aquéllos o enterrándolos profundamente con cal.

Hemos de resaltar, para tranquilidad de los ganaderos, que esta enfermedad ataca exclusivamente a los porcinos, por lo cual no hay peligro de contagio a otras especies ganaderas. Pero como el virus, por su pequeñez, es extremadamente difusible, debe vigilarse los desplazamientos de otras especies que hayan convivido con reses porcinas, ya que en sus pezuñas, pelos o lana pueden llevar el virus, y por tanto ser un medio de contaminación. Igualmente hay que tener la precaución, mientras dura este estado de alarma, de evitar que, en una explotación porcina sana, entren personas extrañas a la casa, en

5.º Echar piensos de origen conocido o de la propia cosecha, y si han sido molidos, adminis-

corrales, pocilgas y cebaderos.

En todo caso de sospecha, el veterinario será quien deberá dictaminar las precauciones y medidas especiales que hayan de tomarse, pues se ha cursado a todos los veterinarios de la provincia información suficiente respecto a este nuevo morbo porcino; en ellos, con su técnica y conocimientos, es en quien debe confiar el ganadero, ya que en todo momento están al servicio de esta importante faceta de la riqueza nacional.

J. POLLOS HERRERA

GANADERIA riqueza

Impresiones favorables sobre la evolución de la "peste porcina africana"

Se aprecia una baja sensible en los precios del ganado

Empecemos por referirnos a ese latigazo de "peste porcina africana" que se ha manifestado en algunas zonas de Badajoz por propagación desde territorio portugués, donde la enfermedad ha alcanzado mayor gravedad, hasta ahora, que en suelo español. Por nuestra parte llevamos perdidos por efecto de dicha enfermedad, o por sacrificio de animales pertenecientes a piaras contaminadas varias millares de cabezas. Afortunadamente parece que las últimas impresiones son favorables merced a las medidas drásticas pertinentes aplicadas por la sanidad veterinaria. Debemos subrayar la resolución gubernamental sobre indemnización a los dueños de los animales sacrificados por el importe total del valor de esas unidades. Todo eso está muy bien, pero sea nos permitido subrayar la conveniencia de que se establezca un más rígido control para el paso de ganado por la frontera hispano-portuguesa. Según nuestras noticias en algunas zonas los animales cruzan libremente la línea fronteriza en pastoreo normal, y se dan casos de traslado de piaras de unas fincas a otras situadas en territorio distinto al de origen del ganado para aprovechamiento de pastos. Esto es en extremo arriesgado. Y aunque resulta difícil precisar cuáles son los "agentes transmisores" del virus de la enfermedad, parece a simple vista que el medio más fácil de propagación es aquel sistema de pastoreo.

Tenemos un ingrato recuerdo de la "lengua azul" en 1956, y no hemos olvidado que en 1958 se produjo en el país hermano otro brote de "peste africana" de muy grave alcance también, brote que no penetró en España merced a las rápidas y enérgicas medidas de defensa que fueron adoptadas por nuestra Dirección General de Ganadería. En fin, estos casos deben inducir a considerar seriamente los peligros del sistema actual de intercambio de pastoreo entre Portugal y España. Por lo demás, el estado sanitario de nuestra cabaña, por lo que se refiere a otras epizootias, sigue siendo satisfactorio como venimos señalando, a pesar de que las condiciones climatológicas reinantes parecen propicias a la aparición de aquéllas o por lo menos, a que se manifiesten las que se consideran de carácter endémico.

En la Montaña las praderías adolecen de falta de humedad, aunque la situación no es mala en ese aspecto, y, por otra parte, el tono seco del ambiente favorece el corte de hierba. De cualquier modo se aprecia una baja sensible en los precios del ganado, baja que es particularmente significativa en terneros, cuyas cotizaciones oscilan alrededor de 600 pesetas por unidad, frente a 1.000 que valían. En las reses el descenso se cifra por término medio en 1.000 pesetas.

En el resto del país se mantienen los pastos en el conocido tono de abundancia. Mérida comunica una baja muy sensible en los precios del ganado. "El de los corderos —añade nuestro servicio especial— ha descendido por debajo del que tiene el pescado, contrariamente a lo que siempre ha ocurrido." En Ubeda (Jaén) los corderos se pagan a 14,50-15 pesetas kilo en vivo, apreciándose grandes disponibilidades de carne. Ciudad Real anota una invasión de corderos merinos de Extremadura de los que siguen saliendo para Levante expediciones en camiones, oscilando las cotizaciones entre 14,50 y 14,75 pesetas el kilo en vivo en las comarcas de Castuera y Cabeza de Buey. En la de Vereda-Brazatortas se llegan a pagar a 13. El cordero manchego o pascual se cotiza 19-20, influído por la abundancia del merino extremeño, sin el cual aquél se cotizaría alrededor de las 23. La carne de merino se vende en Alcázar de San Juan a 33 pesetas, lo que repercute ostensiblemente en el ramo de la pescadería en el sentido favorable para el consumidor. Medina del Campo tuvo el domingo pasado un mercado realmente extraordinario, con entrada de más de 19.000 cabezas, en su gran mayoría lanares.

INFORMACION de Mercados

LANA

Se vuelve a señalar cierta actividad de compra. Se insiste desde Extremadura que se hacen algunas transacciones con el nuevo corte, pagándose la merina extremeña sobre 60 pesetas el kilo; a 45 la de Mérida, y de 35 a 40 la de Barros. En tierras manchegas, precios teóricos son 40 pesetas para la blanca y 35 para la negra. Hay que anotar la venta de pequeñas partidas en Madridejos y Consuegra, entre 40 y 46 pesetas, pero esto no ha pasado de ser un conato, porque en seguida desaparecieron los compradores. Por la zona de Medina del Campo, compradores "por su cuenta y riesgo"; es decir, al margen de las fábricas, ofrecen a 30-38 pesetas por kilo, operándose muy poco.

PIENSOS

Tónica general de paralización, con predominio de la oferta. Dos factores influyen en la situación. El panorama herbáceo, muy favorable, y las perspectivas de mayor cosecha de lo que se esperaba. Por otra parte, influyen también los anuncios de importaciones, la última referida a maíz, por un valor total de 1.100.000 dólares, aunque en realidad están orientadas hacia las explotaciones avícolas y pecuarias, cuyo abastecimiento y rendimiento se trata de asegurar al margen de las disponibilidades nacionales de esos productos.

VINOS

Desorientación y paralización en el mercado manchego. Casi de un modo teórico podría darse el precio de 33 pesetas grado y hectolitro como vigente. Entre la oferta y la demanda las posiciones están distanciadas por una a tres pesetas. Medina del Campo señala ligero aumento de salidas por comienzo de siega, cotizándose desde 96 pesetas la arroba de dieciséis litros.

REMOLACHA

No hay novedades en este también importantísimo cultivo. Hasta las siembras tardías se desarrollan bien. Su nascencia en la cuenca del Duero es normal. La zona menos prometedora es, por el momento, la alavesa.

VENTANAL DE EXTENSION AGRICOLA

La roña o sarna del ganado lanar y su tratamiento

Las reses lanares, como los animales de las principales especies domésticas, pueden padecer tres clases de sarnas, producidas por diferentes géneros de acáridos, como son la sarna sarcóptica, la corióptica y la psoróptica. Nos ocuparemos ligeramente de las dos primeras, para detenernos más en la última forma mencionada, por ser la que con mayor frecuencia se presenta en el ganado lanar y la responsable de la disminución de la renta del mismo.

SARNA SARCOPTICA.—Es producida por el sarcoptes (gadmilde arador). Se presenta en las partes del cuerpo desprovistas de lana y raramente se propaga al tronco.

De manera corriente es producida en los labios, extendiéndose por todo el rostro y cara externa de las ovejas; de ahí el nombre de sarna de la cabeza. Los animales atacados manifiestan gran picazón en la región enferma y tienen dificultad para la presión de los piensos.

SARNA CORIOPTICA.—Es producida por el corioptes dermatuphagu (ácaro devorador de escamas). Apenas tiene importancia en el ganado lanar. Se la conoce también con el nombre de sarna del pie o del menudillo, por ser las cuartillas y menudillos posteriores donde suele localizarse.

SARNA PSOROPTICA.—Esta es la forma que se conoce como la sarna del ganado lanar, ya que es la más generalizada y la que origina más perjuicios económicos, estando afectado por esta enfermedad el diez por ciento del ganado lanar y ascendiendo las pérdidas a más de veinte millones de pesetas.

La origina el psoroptes dermatocoptes chupador, el mayor de los ácaros de la sarna, redondeado y con cuatro pares de patas. Es blanco-amarillento y se ve con lupa sobre fondo oscuro. Tiene un aparato especial mediante el cual chupa los jugos de la piel donde se clava.

Este género de ácaro hace su presentación en las regiones del cuerpo más pobladas de lana, empezando generalmente por la grupa y el dorso, de donde se propaga a lo largo de la línea dorsal, respetando la parte anterior del pecho y la inferior del vientre, no así el cuello y la base de la cola, que igualmente se encuentran invadidos.

El primer síntoma visible es el prurito o picazón que hace que los animales enfermos manifiesten deseos de rascarse, pierdan el apetito y lleguen a enflaquecer de forma alarmante, pudiendo dar origen a la muerte del animal por caquexia general.

Otros síntomas característicos de la enfermedad son los movimientos especiales que los animales hacen con la cabeza y extremidades posteriores; entreabren y mueven alternativamente las mandíbulas, castañeteando o rechinando los dientes.

Los rendimientos de la explotación disminuyen considerablemente por la merma en la producción de leche y la pérdida de lana en cantidad y calidad; ésto sin contar el aumento de bajas en la paridera, porque tales ovejas sólo pueden dar crías enclenques y enfermizas.

Todo ello puede evitarse sencilla y económicacente con los BAÑOS ANTISARNICOS, que deben ser, en todo rebaño ovino bien atendido, una práctica habitual hasta que se extirpe totalmente este azote de la ganadería lanar.

Pero para ello es necesario que los ganaderos, guiados por el espíritu de cooperación y acogiéndose a los beneficios que el Estado concede, se decidan a construir en sus localidades una instalación adecuada donde puedan bañarse las ovejas del término y la cual debe cumplir con las mínimas condiciones siguientes:

Antes del baño propiamente dicho debe construirse un parque o cerca donde se puedan reunir los ganados. Esta cerca se irá estrechando en forma de manga hasta la entrada del baño, con objeto de obligar a los animales a entrar en el baño uno a uno. A la entrada de la excavación que constituye el baño debe disponerse una rampa de fuerte pendiente para que el ganado caiga al agua. La longitud del baño debe ser tal que durante su recorrido queden los animales completamente mojados y puedan actuar el debido tiempo los productos antiparasitarios: de cinco a ocho metros para los baños de ganado menor y de doce a dieciocho para los de ganado mayor. Al otro extremo del baño debe construirse una rampa suave, lo suficientemente en su superficie para que el ganado salga cómodamente por su propio pie. Unos escalones contribuyen al fin mencionado. Una vez bañado, el ganado debe permanecer en otro parque o corraliza cerrada, mientras se orea y escurre el agua. El piso de este cercado debe de ser impermeable y con pendiente hacia el baño para que no se embarre. Los muros que constituyen las paredes laterales del baño deben prolongarse sobre el nivel del suelo, a fin de que los pastores puedan atender desde el exterior al manejo del ganado. La profundidad del baño debe ser tal que el agua cubra por completo a las reses en su caída; 1,20 metros para el ganado menor y 1,80 metros para el ganado mayor son suficientes. La anchura debe permitir el paso holgado de los animales uno a uno, pero ha de ser la justa para impedir que se vuelvan, obligándoles con ello a seguir adelante; de 60 a 80 centímetros en los baños del ganado menor y de uno a 1,20 metros en los del ganado mayor. Se construirá siempre que sea posible un desagüe de fondo para la cómoda evacuación de las aguas sucias una vez terminada la faena o siempre que haya de renovarse el agua. El sitio para construir el baño debe elegirse: Inmediato a los locales del ganado; próximo a una fuente, pozo o conducción de agua que permita llenarlo sin dificultades, sin escatimar su renovación. Despejado para situar con holgura los parques de entrada y salida del ganado y donde la evacuación del agua sea lo más fácil posible.

Los productos a emplear en la práctica del baño se conocen con el nombre de antisárnicos, existiendo muchas fórmulas, la mayoría en desuso por ser antieconómico su empleo y otras por contener productos considerados perjudiciales para la lana y aún para el animal, como son aquellos que en su composición interviene el arsénico.

Siendo el azufre uno de los más enérgicos antiparasitarios, nos inclinamos por la siguiente fórmula:

Azufre, dos kilogramos; cal viva, 40 kilogramos; agua, mil litros.

Pero como la preparación de la misma es delicada, ya que hay que tener en cuenta la calidad del azufre y de la cal, proporciones, cantidad, tiempo de ebullición, etc., no dudamos en recomendar al ganadero la "mixtura sulfocálcica concentrada", que, con la garantía de su registro en la Dirección General de Ganadería, se encuentra en el comercio ya preparada para su disolución en el agua. Sustituye eficazmente a la mixtura sulfocálcica, los modernos preparados de H. C. H. o lindano, pero tiene el inconveniente que las ovejas débiles o con heridas o cortaduras en la piel no deben bañarse por correr peligro de intoxicación grave.

Los baños deben darse por la mañana en días claros y templados, y siempre para evitar enfriamientos deben de terminar tres horas antes de la puesta del sol. Las ovejas deben de estar descansadas y sin comer desde el día anterior para que no ensucien el baño. Nunca se bañarán sedientas, ni con tos o "moquillo", ni tampoco las preñadas, y en general las deficientes de salud.

Aun cuando se sumerja la cabeza del animal en el líquido, es conveniente, antes o después del baño, limpiar las orejas y fosetas lagrimales con un trapo o copo de lana mojado en el antisárnico.

Los corrales, rediles, cancillas, teleras y demás utensilios con que tienen contacto las ovejas, deben pulverizarse con el mismo líquido empleado en el baño.

El Instituto Nacional de Colonización facilita proyectos gratuitos para la construcción de estos baños, y también el ganadero puede acogerse a los beneficios de dicho Instituto, que en forma de anticipos y subvenciones le concede.

La ganadería lanar puede librarse de esta enfermedad parasitaria que tantos perjuicios económicos ocasiona. El remedio es fácil y el Estado ayuda. Las Agencias Comarcales de Extensión Agrícola de esta provincia esperan para informar al ganadero, que es en definitiva, el que tiene la palabra.

JULIO DIEZ SENDINO
Agente de Extensión Agrícola en Tordesillas.

ACEITUNA

Al comienzo del verano astronómico; es decir, cuando la aceituna empieza a destacarse entre el follaje —Andalucía va por delante, como es sabido—, se insiste en que puede ser este un año de fallo de la "vecería". Con arreglo a las producciones del olivar, 1960-61 debería significarse por una producción corta, supuesto que la anterior fue abundante. Pues bien, sigue imperando la impresión de que la próxima cosecha puede llegar a ser incluso superior a la anterior.

SGCB2021